

**RICCARDO GROPPALI**

# **DJOU DJ ET SES OISEAUX**

**L'avifaune du Parc National et du  
Sénégal atlantique et Gambie**



COLLABORAZIONE  
INTERNAZIONALE




PARCO  
ADDA SUD



Riccardo Groppali

***DJOU DJ ET SES OISEAUX:  
l'avifaune du Parc National et du  
Sénégal atlantique et Gambie***



**Parc Adda Sud**  
*avec la collaboration du*



Département d'Ecologie du Territoire - Université de Pavie



Musée d'Histoire Naturelle - Cremona



Rotary International - District 2050


**PARCO ADDA SUD  
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE - A  
2006**

dessins de Sergio Frugis pour les espèces européennes et  
pris de l'oeuvre du Brehm pour les espèces africaines

**Remerciements:** Didi Abdel-Haviz, Salif Badiane, Lucia Bertolotti, Mario Campi, Attilio Dadda, Abdoulaye Diop, Cinzia Galli, Souleymanie Gueye, Dominique Manga, Ibrahima Mbaye, Pierfrancesco Peloso, Jacques Peeters, Andrea Poggio, Issa Sidibe, Elisa Votta et Rotary Club – Saint-Louis.

**La publication de ce livre a été possible pour la collaboration  
entre le Parc National des Oiseaux du Djoudj et  
le Parc Adda Sud (Lombardie – Italie), jumellés en 2004**

*A Cristina, Giulia e Vera*



*Les bénéfices de la vente de ce livre, réalisé par le Parc Adda Sud,  
seront destinés au Parc du Djoudj et aux villages voisins.*



## Présentation

*En arrivant à Djoudj de droites colonnes de fumée noire annoncent les incendies des cannes, l'eau s'était retirée et un terrain semi-aride mettait en relief le peu d'arbres, quelque'un plein de nids en copropriété.*

*C'est une vision presque lunaire, irréelle.*

*C'est un contraste: de couleurs et de sensations.*

*C'est là une Afrique toute particulière!*

*Au coeur du Parc de Djoudj la présence dominante est l'eau et la riche végétation palustre: on est aussitôt frappé du lent battement d'aile du grand pélican et la majestueuse silhouette de la grue couronnée; sur la terre ferme le chacal court dans la savane toujours loin de l'homme et la bouée laisse de grandes traces sur le terrain.*

*À ce coin du Sénégal il y a un patrimoine de biodiversité unique. Ici on peut voir les efforts de ceux qui, des différents côtés de notre planète, travaillent quotidiennement pour l'environnement et pour les communautés d'animaux et végétaux.*

*Surtout les oiseaux migrateurs sont les ambassadeurs de la qualité et de la quantité des efforts internationaux et de coopération scientifique entre les Parcs et les Pays.*

*On peut sauvegarder et valoriser ces animaux seulement avec l'application concertée et le travail commun.*

*Dans des endroits tels que nos Parcs on peut faire un développement soutenable et durable, un correct employ des ressources naturelles et une valorisation de la tradition et de la culture locale.*

*Il est déjà difficile dans une situation de paix et de hauts niveaux industriels de travailler dans les Parcs et pour l'environnement, le faire dans des lieux où le développement va s'organiser et en conditions extrêmes est une vraie défi.*

*On veut, nous du Parc Adda Sud, collaborer efficacement avec le Parc national de Djoudj et vaincre cette défi, on veut travailler ensemble pour la sauvegarde de la nature et pour transmettre aux futures générations de notre planète un endroit extraordinaire tel que ces rives du fleuve Senegal.*

*Bon travail mes amis*

*Attilio Dadda  
Président du Parc Add Sud*



Travail bien fouillé de l'équipe de M. Riccardo Groppali, qui reflète parfaitement bien l'état des ressources naturelles du Parc National des Oiseaux du Djoudj. Je suis sûr que le naturaliste y trouvera tous les détails nécessaires pour la bonne identification des espèces. Outre le fait de mettre à la disposition des conservateurs et des chercheurs un outil de premier choix, le Parc Adda Sud (Lombardie, Italie) qui a réalisé ce guide, a décidé d'utiliser les bénéfices de sa vente au bénéfice exclusif du Parc National du Djoudi et des villages riverains qui participent activement à sa gestion durable, suivant le binôme Conservation-Valorisation. Ceci n'est-il pas une parfaite illustration de ce que doit être la coopération Nord-Sud, à travers notamment le jumelage de ces deux parcs.

Colonel Mame Balla GUEYE,  
Directeur des Parcs Nationaux du Sénégal

Nous ne pouvons que saluer et nous réjouir du sens de cet ouvrage qui colle parfaitement avec les objectifs de la coopération qui est entrain de se construire entre les Parcs du Djoudj et d'Adda Sud, en d'autres termes, entre le Nord et le Sud, itinéraire que suivent les oiseaux du Paléartique pour regagner leurs quartiers estivaux.

Que vivent les deux Parcs pour une collaboration toujours plus fructueuse et enrichissante.

Commandant Abdoulaye DIOP,  
Conservateur du Parc National du Djoudj



# Le Parc National des Oiseaux du Djoudj

Créé en 1971 pour la conservation d'un territoire d'importance extraordinaire dans le Delta du Sénégal, le Parc du Djoudj couvre une surface de 16.000 hectares. La collocation du territoire protégé au sud du Sahara, la présence de vastes zones humides différentes et la proximité au fleuve Sénégal et à l'océan Atlantique font du Parc l'une des zones africaines les plus importantes pour ses peuplements ornithologiques.

Le Parc, une cuvette d'inondation du fleuve Sénégal, est l'un des principaux sites continentaux d'hivernage d'Oiseaux migrateurs du Paléarctique occidental et de nombreuses migrateurs et résidents africains: pour cette raison à partir de 1981 est inscrit sur la Liste des Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO et de 1984 sur la Liste des Zones Humides d'Importance Internationale de la Convention de Ramsar.

La biodiversité du Parc, avec 350 espèces d'Oiseaux environ et jusqu'à 3.000.000 d'individus chaque année, est très grande pour les Poissons aussi: dans ses eaux sont présents 92 espèces de 24 familles différentes.

La réalisation de barrages sur le fleuve (Diama en 1986 et Manantali en 1989) a modifié profondément le cycle originnaire des eaux dans le Parc: aujourd'hui l'alimentation hydrique du Djoudj est artificielle, initialement une fois par an (dans la normale saison de la crue, entre août et octobre) et, à partir de 2002, une deuxième fois aussi à la fin d'avril, pour prolonger l'attraction touristique du Parc jusqu'à juin. Les effets de ce changement sont une forte salinisation des sols (dans le bassin du Djoudj l'eau s'éloigne seulement avec l'évaporation) et l'invasion de quelques espèces herbacées d'eau douce (et notamment *Typha* et *Phragmites*) dans la portion du Parc plus près au fleuve.

Autres menaces sont dérivées de l'apparition des plantes aquatiques infestantes, comme *Salvinia molesta*, qui peuvent couvrir totalement la surface de l'eau, modifier la productivité primaire des zones humides et accélérer la sédimentation.

L'endiguement du fleuve a permis l'irrigation de grandes surfaces dans le territoire du Delta du Sénégal: les cultures irriguées se sont pourtant développées avec une grande vitesse, mais leur productivité est plus basse qu'on l'avait prévu. Le risque est qu'un ultérieur agrandissement des cultivations autour du Parc puisse modifier irréversiblement l'hydrologie du territoire protégé et provoquer une contamination progressive avec des substances biocides.

Pour contraster cette évolution est donc nécessaire développer un tourisme éco-compatible et améliorer la collaboration internationale entre le Parc National des Oiseaux du Djoudj et d'autres zones humides protégées européennes: cette petite guide de l'avifaune du Parc, fruit du jumelage avec le Parc Adda Sud de l'Italie septentrionale, est un exemple de collaboration transnationale, destinée aux touristes et naturalistes en visite au Parc, pour leur faire mieux apprécier l'extraordinaire richesse et beauté de l'environnement du Djoudj.



# Les Oiseaux du Djoudj

La guide est partiellement illustrée: pour reconnaître les espèces du Parc est donc nécessaire utiliser des textes avec les nécessaires représentations des Oiseaux présents. Parmi les textes disponibles on peut signaler:

- van Perlo B., 2002. *Birds of western & central Africa*. Collins, London.
- Borrow N., Demey R., 2001. *Birds of Western Africa*. Christopher Helm, London.
- Serle W., Morel G.J., Hartwig W., 1977. *A field guide to the Birds of West Africa*. Collins, London.
- Barlow C., Wachter T., Disley T., 1997. *A field guide to Birds of The Gambia and Senegal*. Pica Press, Sussex (GB).

Pour chaque espèce présente dans le Parc de Djoudj (marquée avec deux astérisques \*\* si observée par l'Auteur dans le Parc et avec un astérisque \* si observée dans ses environnements, pendant des relevements en février et décembre 2003 et en décembre 2004) sont examinés:

- situation récent au Sénégal septentrional, en utilisant Borrow N., Demey R., 2001. *Birds of Western Africa*. Christopher Helm, London.
- situation entre 2002 et 2004 dans le Parc National des Oiseaux de Djoudj, les autres zones humides de la partie sénégalaise du Delta du Sénégal et le Lac de Guier, en utilisant les résultats des recensements réalisés à mi-janvier par la Direction des Parcs Nationaux (Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature) de la République du Sénégal.
- situation entre 1984 et 1994 dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj, avec quelques nombres maximales d'individus relevés, en utilisant Rodwell S.P., Sauvage A., Rumsey S.J.R., Bräunlich A., 1996 - *An annotated check-list of Birds occurring at the Parc National des Oiseaux du Djoudj*, Malimbus, 18: 74-111, et les suivantes catégories: rare = 5 ou moins d'observations en 1984-1994; peu nombreux = 6-20 observations en 1984-1994; pas commun = observé rarement; fréquent = 1-10 oiseaux observés dans la plupart des jours en 1984-1994; commun = jusqu'à 100 oiseaux observés dans la plupart des jours en 1984-1994; très commun = plus que 100 oiseaux observés dans la plupart des jours en 1984-1994.
- période de présence dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj, selon indications de la Direction du Parc.
- situation des Oiseaux aquatiques dans le Delta du Sine-Saloum et la Petite Côte en janvier 1997, en utilisant Schepers F.J., Keijl G.O., Meininger P.L., Rigoulot J.B., 1998 - *Oiseaux d'eau dans le Delta du Sine-Saloum et la Petite Côte*, Sénégal. WIWO Report 63, Zeist (NL).
- situation en Gambie jusqu'à 1990, en utilisant Gore M.E.J., 1990 - *Birds of the Gambia*, British Ornithologists' Union, Check-list 3, Herts (GB), et les suivantes catégories: rare = rarement présent; peu nombreux = irrégulier ou pas fréquent dans l'habitat normal; pas commun = assez fréquent dans l'habitat

normal; fréquent = normalement, mais pas constamment, observable dans l'habitat normal; commun = constamment observable dans l'habitat normal, individuellement ou en bon quantité; très commun = constamment observable dans l'habitat normal, en grande quantité.

Pour Gambie et Sénégal a été utilisé aussi Barlow C., Wacher T., Disley T., 1999. *A field guide to Birds of the Gambia and Senegal*. Pica Press, Sussex (GB).

## PODICIPEDIDAE

### 1. Grèbe castagneux

Little Grebe, Tuffetto – *Tachybaptus ruficollis*\*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun (surtout dans l'hiver pour l'apport des hivernants européens), rare nicheur et migrateur intra-africain, présent sur les eaux douces en particulier dans la saison sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 73 (36% du total) et Delta du Sénégal 131 en 2002; Djoudj 52 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 26 (60% du total) et Delta du Sénégal 17 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = nicheur (en novembre-février) afrotropical commun, plus abondant en janvier-février (n. max. 1984-1994: env. 270 en janvier 1991).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2, Petite Côte 28, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur intra-africain régulier pendant la saison sèche (novembre-juillet) et possible nicheur.

### 2. Grèbe huppé

Great Crested Grebe, Svasso maggiore – *Podiceps cristatus*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = 1 en janvier 1971.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = pas observé.

### 3. Grèbe à cou noir




Black-necked Grebe, Svasso piccolo – *Podiceps nigricollis*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen, plus régulier comme hivernant à partir de 1990, présent entre octobre et mai.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = pas observé jusqu'à 1994.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = décembre.

*Gambie* = pas présent.



**Grébe castagneux (1)**

Little Grebe, Tuffetto – *Tachybaptus ruficollis*

**Grébe à cou noir (3)**

Black-necked Grebe, Svasso piccolo – *Podiceps nigricollis*

**Grébe huppé (2)**

Great Crested Grebe, Svasso maggiore – *Podiceps cristatus*

**Grand Cormoran (4)**

White-breasted Cormorant, Cormorano – *Phalacrocorax carbo*

## PHALACROCORACIDAE

### 4. Grand Cormoran

White-breasted Cormorant, Cormorano – *Phalacrocorax carbo* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun et nicheur.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 2.421 (87% du total) et Delta du Sénégal 351 en 2002; Djoudj 2.298 (89% du total) et Delta du Sénégal 285 en 2003; Djoudj 1.358 (37% du total) et Delta du Sénégal 2.325 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = nicheur afrotropical (en septembre-mars, avec env. 660 couples en 1994), très commun (n. max. 1984-1994: 3.840 en janvier 1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 145, Petite Côte 11, Dakar 850.

*Gambie* = fréquent migrateur intra-africain pendant la saison sèche.

### 5. Cormoran africain

Long-tailed Cormorant, Cormorano africano - *Phalacrocorax africanus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 609 (76% du total) et Delta du Sénégal 193 en 2002; Djoudj 670 (91% du total) et Delta du Sénégal 64 en 2003; Djoudj 860 (61% du total), Lac de Guier 6 et Delta du Sénégal 537 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = nicheur afrotropical habituellement très commun (n. max 1984-1994: 2.944 en décembre 1985).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.610, Petite Côte 94, Dakar 60.

*Gambie* = commun résident et nicheur (200-300 couples en 1969, 1987 et 1988).

## ANHINGIDAE


### 6. Anhinga d'Afrique

Darter, Aninga africana - *Anhinga rufa* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun et nicheur pas commun.


*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 487 (94% du total) et Delta du Sénégal 30 en 2002; Djoudj 449 (99% du total) et Delta du Sénégal 3 en 2003; Djoudj 306 (99% du total), Lac de Guier 3 et Delta du Sénégal 1 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = nicheur afrotropical habituellement très



**Anhinga d'Afrique (6)**

Darter, Aninga africana - *Anhinga rufa*



**Pélican blanc (7)**

Great White Pelican, Pellicano – *Pelecanus onocrotalus*

commun (n. max. 1984-1994: 1.868 en décembre 1985); rarement observé avec moins de 100 exemplaires chaque relèvement à partir de 1990.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 10, Petite Côte 1, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur (moins que 30 couples en août 1969).

## PELECANIDAE

### 7. Pélican blanc

Great White Pelican, Pellicano – *Pelecanus onocrotalus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur dans le delta du Sénégal, et migrateur intra-africain et nicheur ailleurs.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 9.366 (86% du total) et Delta du Sénégal 1.518 en 2002; Djoudj 5.069 (94% du total) et Delta du Sénégal 305 en 2003; Djoudj 12.595 (87% du total) et Delta du Sénégal 1.881 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = nicheur afro-tropical (en novembre-avril, avec env. 1.500 jeunes en mars 1991) très commun (n. max. 13.524 en janvier 1994), mais irrégulier: pas de nidifications en 1986 et 1988.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 141, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent migrateur intra-africain pendant la saison sèche (n. max. env. 250), normalement en groupes de 20-50 adultes.

### 8. Pélican gris

Pink-backed Pelican, Pellicano rossiccio - *Pelecanus rufescens* \*\*

*Sénégal septentrional* = surtout résident, mais migrateur et nicheur aussi, pas commun.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 57 (47% du total) et Delta du Sénégal 65 en 2002; Djoudj 44 (32% du total) et Delta du Sénégal 92 en 2003; Djoudj 19 (6% du total) et Delta du Sénégal 321 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = fréquent nicheur afro-tropical (env. 10 couples en décembre 1985).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent en décembre et janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.254, Petite Côte 254, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur en septembre-janvier (env. 70 couples en 1987).

## ARDEIDAE

### 9. Butor étoilé

Eurasian Bittern, Tarabuso – *Botaurus stellaris* \*\*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen, présent entre janvier et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = présent en janvier et mars.

*Gambie* = migrateur européen rare.

### 10. Blongiois nain

Little Bittern, Tarabusino – *Ixobrychus minutus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen (présent entre octobre et la moitié d'avril) fréquent (n. max. en 1984-1994: 43 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = rare résident (localement fréquent dans la saison des pluies, entre juin et novembre) et hivernant européen aussi, et exceptionnellement nicheur.

### 11. Blongiois de Sturm

Dwarf Bittern, Tarabusino nano africano - *Ixobrychus sturmii*

*Sénégal septentrional* = migrateur intra-africain pas commun, présent pendant la saison des pluies (entre février et décembre) et nicheur.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare, niche dans le delta du Sénégal pendant la saison des pluies.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = résident peu nombreux.

### 12. Bihoreau gris

Black-crowned Night-heron, Nitticora – *Nycticorax nycticorax* \*\*

*Sénégal septentrional* = nicheur localement commun, migrateur et hivernant européen très commun entre décembre et mars.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 7.610 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 4.542 (100% du total dans le Delta du Sénégal 305 en 2003; Djoudj 5.026 (99% du total) et Delta du Sénégal 11 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical (quelques centaines de nids en 1985 et 1987), migrateur européen très commun (n. max. 1984-1994: env. 5.000 en janvier 1994).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 11, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident commun, nombreux surtout en octobre-mars pour la présence

des hivernants européens, et nicheur pas fréquent (20-40 couples en juillet-septembre 1966).

### 13. Héron crabier

Squacco Heron, Sgarza ciuffetto – *Ardeola ralloides* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et migrateur européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 74 (74% du total) et Delta du Sénégal 25 en 2002; Djoudj 60 (78% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 16 en 2003; Djoudj 76 (58% du total), Lac de Guier 4 et Delta du Sénégal 48 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = nicheur afrotropical, migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: env. 60 en mars 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = résident et nicheur (en juillet-septembre, avec 150-200 couples) fréquent, surtout en octobre-mars pour la présence des hivernants européens.

### 14. Héron gardebœufs

Cattle Egret, Airone guardabuoi – *Bubulcus ibis* \*\*

*Sénégal septentrional* = très commun résident et migrateur intra-africain, présent surtout entre novembre et mars, mais nicheur pas fréquent.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 1 (0,7% du total) et Delta du Sénégal 143 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 5 en 2003; Djoudj 20 (12% du total) et Delta du Sénégal 154 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical habituellement commun (n. max. 1984-1994: env. 1.290 en janvier 1994, dans un essaim de locustes); rarement observé avec moins de 100 exemplaires pour relèvement.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.080, Petite Côte 1.242, Dakar 975.


*Gambie* = commun résident et nicheur, présent en juillet-septembre.

### 15. Héron strié

Green Heron, Airone striato - *Butorides striatus*

*Sénégal septentrional* = résident et nicheur commun surtout pendant la saison des pluies.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 10 en septembre 1992), moins commun en octobre-novembre et pas commun en décembre-avril, avec quelques nidifications.



**Butor étoilé (9)**

Eurasian Bittern, Tarabuso – *Botaurus stellaris*

**10. Blongiois nain (10)**

Little Bittern, Tarabusino – *Ixobrychus minutus*

**Héron crabier (13)**

Squacco Heron, Sgarza ciuffetto – *Ardeola ralloides*

**Bihoreau gris (12)**

Black-crowned Night-heron, Nitticora – *Nycticorax nycticorax*

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 3, Petite Côte 1, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur en août-novembre, et quelques fois présent jusqu'à décembre.

## **16. Aigrette ardoisée**

Black Heron, Garzetta ardesia - *Egretta ardesiaca* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 31 (56% du total) et Delta du Sénégal 24 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 37 en 2003; Djoudj 9 (56% du total) et Delta du Sénégal 7 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 120 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Gambie* = commun résident et nicheur peu nombreux, et migrateur intra-africain aussi pendant la saison des pluies (n. max. 70-80 en janvier 1974). Dans la saison sèche se réunit souvent et imprévisiblement en grands groupes dans quelques zones humides.

## **17. Aigrette à gorge blanche**

Western Reef Egret, Garzetta dei reef occidentale - *Egretta gularis* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident commun surtout dans les zones côtières.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 1 (0,9% du total) et Delta du Sénégal 105 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 143 en 2003; Djoudj 5 (0,7% du total) et Delta du Sénégal 736 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical résident et migrateur fréquent (n. max. entre 1984 et 1994: env. 200 en novembre 1987); très rares observations d'exemplaires blanches.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.729, Petite Côte 33, Dakar 3.

*Gambie* = commun résident et nicheur, présent entre juillet et octobre.

## **18. Aigree**

Little Egret, Garzetta – *Egretta garzetta* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident, plus nombreux en présence des migrateurs et hivernants européens.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 109 (41% du total) et Delta du Sénégal 159 en 2002; Djoudj 75

(80% du total), Lac de Guier 5 et Delta du Sénégal 125 en 2003; Djoudj 118 (4% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 3.194 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun afrotropical et migrateur européen (n. max. 1984-1994: 1.228 en décembre 1985) et nicheur.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 852, Petite Côte 113, Dakar 20.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur, plus nombreux en octobre-mars pour la présence d'hivernants européens.

## 19. Aigrette intermédiaire

Intermediate Egret, Garzetta intermedia - *Egretta intermedia* \*\*

[syn. *Mesophoyx intermedia*]

*Sénégal septentrional* = surtout résident et fréquent.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 29 en 2002; Djoudj 6 (24% du total) et Delta du Sénégal 19 en 2003; Djoudj 15 (29% du total) et Delta du Sénégal 37 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 20 en mars 1992), mais rarement avec plus que 5 exemplaires pour relèvement, et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre août et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 7, Petite Côte 0, Dakar 8.

*Gambie* = résident peu nombreux et migrateur intra-africain pendant la saison sèche, et nicheur (n. max. env. 30 couples en février 1987).

## 20. Grande aigrette

Great Egret, Airone bianco maggiore – *Egretta alba* \*\*

[syn. *Casmerodius albus*]

*Sénégal septentrional* = fréquent résident.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 227 (89% du total) et Delta du Sénégal 27 en 2002; Djoudj 531 (84% du total), Lac de Guier 5 et Delta du Sénégal 125 en 2003; Djoudj 322 (75% du total) et Delta du Sénégal 105 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical très commun (n. max. 1984-1994: 3.413 en janvier 1991) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 287, Petite Côte 18, Dakar 2.

*Gambie* = commun résident et nicheur en juillet-décembre, en plusieurs colonies de 20-100 couples.

## 21. Héron pourpré

Purple Heron, Airone rosso – *Ardea purpurea* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et migrateur européen, un peu moins nombreux à la fin de la saison sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 90 (99% du total) et Delta du Sénégal 1 en 2002; Djoudj 161 (99% du total) et Lac de Guier 1 en 2003; Djoudj 126 (93% du total) et Delta du Sénégal 10 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical et migrateur européen commun (n. max. 1984-1994: 576 en janvier 1988), surtout avec l'apport des hivernants européens, et nicheur (une colonie de env. 80 nids en décembre 1974).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 13, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident peu nombreux et possible nicheur, plus fréquent en septembre-mars pour la présence des migrants européens.

## 22. Héron cendré

Grey Heron, Airone cenerino – *Ardea cinerea* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur européen commun, plus nombreux au début de la saison sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 204 (49% du total) et Delta du Sénégal 210 en 2002; Djoudj 360 (60% du total), Lac de Guier 15 et Delta du Sénégal 222 en 2003; Djoudj 420 (50% du total), Lac de Guier 3 et Delta du Sénégal 410 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical et migrateur européen commun (n. max. 1984 -1994: 740 en janvier 1988) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre septembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 585, Petite Côte 141, Dakar 34.

*Gambie* = commun hivernant européen et migrateur intra-africain, présent entre septembre et mars.


## 23. Héron mélanocéphale

Black-headed Heron, Airone testanera – *Ardea melanocephala*

*Sénégal septentrional* = migrateur (vers le nord dans la saison des pluies et vers le sud avec la sécheresse) et nicheur, est moins nombreux pendant la saison des pluies.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical peu nombreux, présent surtout en décembre et janvier.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = décembre-janvier et avril.



**Grande aigrette (20)**

Great Egret, Airone bianco maggiore – *Egretta alba*

**Aigrette garzette (18)**

Little Egret, Garzetta – *Egretta garzetta*

**Héron cendré (22)**

Grey Heron, Airone cenerino – *Ardea cinerea*

**Héron pourprés (21)**

Purple Heron, Airone rosso – *Ardea purpurea*

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 15, Petite Côte 2, Dakar 1.

*Gambie* = fréquent migrateur intra-africain et nicheur (en avril-juin), présent surtout dans la saison sèche.

#### **24. Héron goliath**

Goliath Heron, Airone golia - *Ardea goliath* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = en mars et décembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 89, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent résident et probable nicheur, plus nombreux entre janvier et avril.

### SCOPIDAE

#### **25. Ombrette africaine**

Hammerkop, Uccello martello - *Scopus umbretta* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 8 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et février.

*Gambie* = commun résident et nicheur.

### CICONIIDAE

#### **26. Tantale ibis**

Yellow-billed Stork, Tantalo africano - *Mycteria ibis* \*\*


*Sénégal septentrional* = résident pas commun et migrateur, vers le nord pendant la saison des pluies et vers le sud pendant la période sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 404 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 456 (100% dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 98 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun (n. max. 1984-1994: 306 en décembre 1985) et nicheur (25-50 couples en novembre-décembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 16, Petite Côte 0, Dakar 0.



**Héron goliath (24)**

Goliath Heron, Airone golia - *Ardea goliath*

*Gambie* = fréquent et localement commun, nicheur en quelques colonies pendant la saison des pluies.

### **27. Cigogne noire**

Black Stork, Cicogna nera – *Ciconia nigra* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas nombreux.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 3 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 2 (50% du total) et Delta du Sénégal 2 en 2003; Djoudj 1 (4% du total) et Delta du Sénégal 21 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen présent entre octobre et avril, fréquent (n. max. 1984-1994: env. 30 en janvier 1991) et hivernant à partir de 1972 (n. normalement supérieur à 15).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = très rare.

### **28. Cigogne blanche**

White Stork, Cicogna bianca – *Ciconia ciconia*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas nombreux.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 12 en 2002; Djoudj 1 (8% du total) et Delta du Sénégal 12 en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 17 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen présent en novembre-mars, pas commun (n. max. 1984-1994: 25 en janvier 1989) et en déclin dans le Delta du Sénégal à partir de 1960 (n. max. env. 4.000 en novembre 1958).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Gambie* = très rare, et seulement pendant la saison sèche.

### **29. Cigogne épiscopale**

Woolly-necked Stork, Cicogna collo lanoso – *Ciconia episcopus*

*Sénégal septentrional* = rare résident et migrateur intra-africain, vers le nord pendant et après les pluies.


***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = pas observé entre 1984 et 1994.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et novembre.

*Gambie* = présent toute l'année mais rare (plus nombreux entre juillet et décembre, pendant ou tout de suite après les pluies), et probablement nicheur (n. max. 80 en octobre 1996).

### **30. Jabiru d'Afrique**

Saddle-billed Stork, Becco a sella africano - *Ephippiorhynchus senegalensis*



**25. Ombrette africaine**

Hammerkop, Uccello martello - *Scopus umbretta*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et novembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 7, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = probable résident et nicheur, rare.

### 31. Marabout d'Afrique

Marabou Stork, Marabù – *Leptoptilos crumeniferus*

*Sénégal septentrional* = surtout résident, pas commun mais plus fréquent au début de la saison sèche.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 54 en février 1992), mais rarement avec plus que 10 exemplaires pour relèvement, et nicheur avec une petite colonie.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre décembre et février.

*Gambie* = commun migrateur et nicheur entre octobre et mars, avec env. 40 colonies de 5-12 couples.

## THRESKIORNITHIDAE

### 32. Ibis falcinelle

Glossy Ibis, Mignattaio – *Plegadis falcinellus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et migrateur européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 43 (91% du total) et Delta du Sénégal 4 en 2002; Djoudj 136 (68% du total) et Lac de Guier 63 en 2003; Djoudj 45 (82% du total) et Delta du Sénégal 10 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen présent entre octobre et avril, et plus abondant en novembre-février (n. max. 1984-1994: env. 1.000 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen peu nombreux (n. max. 63 en février 1988), présent entre novembre et juin.

### 33. Ibis sacré

Sacred Ibis, Ibis sacro – *Threskiornis aethiopicus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun, présent surtout près des fleuves.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 39 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 156 (99% du total) et Delta du Sénégal 1 en 2003; Djoudj 69 (98% du total) et Delta du Sénégal 1 en 2004.



**Tantale ibis (26)**

Yellow-billed Stork, Tantalo africano - *Mycteria ibis*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun (n. max. 1984-1994: 898 en décembre 1985) et nicheur (entre septembre et novembre).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 28, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident (n. max. env. 150 en janvier 1975) et nicheur peu nombreux, avec plus que 20 nids en novembre 1987.

### **34. Spatule blanche**

Eurasian Spoonbill, *Spatola* – *Platalea leucorodia* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 190 (17% du total) et Delta du Sénégal 943 en 2002; Djoudj 332 (37% du total), Lac de Guier 23 et Delta du Sénégal 531 en 2003; Djoudj 103 (4% du total) et Delta du Sénégal 2.517 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen très commun en octobre-avril et plus abondant en janvier (n. max. 1984-1994: 1.965 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 217, Petite Côte 19, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen rare, observé seulement entre octobre et mars.

### **35. Spatule d'Afrique**

African Spoonbill, *Spatola africana* - *Platalea alba* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas nombreux.


*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 169 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 108 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 46 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur (n. max. 1984-1994: 362 en décembre 1985) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 24, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare résident et nicheur, et migrateur intra-africain peu nombreux pendant la saison sèche, surtout entre décembre et mars.



**Cigogne blanche (28)**

White Stork, Cicogna bianca – *Ciconia ciconia*

**Cigogne noire (27)**

Black Stork, Cicogna nera – *Ciconia nigra*

**Ibis falcinelle (32)**

Glossy Ibis, Mignattaio – *Plegadis falcinellus*

## PHOENICOPTERIDAE

### 36. Flamant rose

Greater Flamingo, Fenicottero rosa - *Phoenicopterus ruber* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun où il y a les colonies de reproducteurs, et hivernant européen. Les populations locales de l'espèce sont compris entre 6.000 et 19.000 Flamants roses par an.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 8.105 (77% du total) et Delta du Sénégal 2.372 en 2002; Djoudj 12.549 (98% du total) et Delta du Sénégal 296 en 2003; Djoudj 2.469 (81% du total) et Delta du Sénégal 571 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical et migrateur européen très commun (n. max. 1984-1994: 24.755 en 1988-1989).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 446, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur intra-africain et hivernant européen presque régulier.

### 37. Petit flamant

Lesser Flamingo, Fenicottero minore - *Phoeniconaias minor*

*Sénégal septentrional* = rare et local.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 3 (2% du total) et Delta du Sénégal 150 en 2002; Djoudj 16 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 315 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical très commun (n. max. 1984-1994: env. 46.500 le 26 février 1990).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et mars et en août.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 13, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain.

## ANATIDAE

### 38. Dendrocygne fauve

Fulvous Whistling Duck, Anatra fischiatrice fulva - *Dendrocygna bicolor* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun et migrateur intra-africain.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 3.228 (99% du total) et Delta du Sénégal 21 en 2002; Djoudj 1995 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 1.405 (99% du total) et Delta du Sénégal 3 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical très commun (n. max. 1984-



**Jabiru d'Afrique (30)**

Saddle-billed Stork, Becco a sella africano - *Ephippiorhynchus senegalensis*

1994: 32.620 en 1986-1987) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = rare, présent entre novembre et avril et surtout en février.

### **39. Dendrocygne veuf**

White-faced Whistling Duck, *Anatra fischiatrice facciabianca* –

*Dendrocygna viduata* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun et migrateur intra-africain, plus nombreux dans les derniers ans.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 49.720 (99% du total) et Delta du Sénégal 337 en 2002; Djoudj 120.683 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 49.758 (85% du total) et Delta du Sénégal 8.474 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical très commun (n. max. 1984-1994: 66.050 in 1985-1986) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 41, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur (entre juillet et octobre), avec groupes de 500 exemplaires pendant la saison sèche, mais plus nombreux dans la saison des pluies.

### **40. Dendrocygne à dos blanc**

White-backed Duck, *Anatra dorso bianco* - *Thalassornis leuconotus*

*Sénégal septentrional* = résident local pas commun.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = pas présent.

### **41. Oie d'Égypte**

Egyptian Goose, *Oca egiziana* – *Alopochen aegyptiacus* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident localisé, avec quelques centaines d'exemplaires dans le Delta du Sénégal.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 407 (99% du total) et Delta du Sénégal 2 en 2002; Djoudj 58 (95% du total) et Lac de Guiere 3 en 2003; Djoudj 125 (64% du total) et Delta du Sénégal 70 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical commun, très commun en 1990-1991 (n. max. 1984-1994: 2.662 en 1991-1992) et nicheur entre octobre et mai.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.



**Marabout d'Afrique (31)**

Marabou Stork, Marabù – *Leptoptilos crumeniferus*

*Gambie* = aujourd'hui rare, mais commun au début de 1900.

#### 42. Tadorne de Belon

Common Shelduck, Tadorna – *Tadorna tadorna*\*\*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen, présent en décembre et janvier.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 2, Dakar 0.

*Gambie* = pas présent.

#### 43. Oie-armée de Gambie

Spur-winged Goose, Oca dallo sperone - *Plectropterus gambensis* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent dans le Delta du Sénégal, pendant la période de la plus grande richesse d'eau et moins nombreux entre février et juin.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun (n. max. 1984-1994: 2.469 en 1987-1988), très commun en 1990-1991 et probablement nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 3, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, à la fin de la saison des pluies (entre octobre et décembre).

#### 44. Canard casqué

Knob-billed Duck, Anatra dal bernoccolo - *Sarkidiornis melanotos* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain, commun dans le Delta du Sénégal pendant la période de la plus grande richesse d'eau.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 777 (99% du total) et Delta du Sénégal 22 en 2002; Djoudj 1.023 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 512 (85% du total) et Delta du Sénégal 90 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun entre octobre et avril (n. max. 1984-1994: 1.074 en 1991-1992), et peu nombreux jusqu'à la fin de novembre. Normalement en petits groupes.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre septembre et avril.


*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 2, Dakar 0.

*Gambie* = commun migrateur intra-africain pendant la saison sèche (n. max. env. 1.000 en mars) et surtout entre janvier et mai, moins nombreux qu'au début du 1900.



**Ibis sacré (33)**

Sacred Ibis, Ibis sacro – *Threskiornis aethiopicus*



**Spatule blanche (34)**

Eurasian Spoonbill, Spatola – *Platalea leucorodia*

#### 45. Sarcelle à oreillons

African Pygmy Goose, Oca pigmea africana - *Nettapus auritus* \*\*

*Sénégal septentrional* = surtout résident, plus nombreux pendant les pluies.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 2 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 39 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 156 (99% du total) et Lac de Guier 1 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare (n. max. env. 300 en décembre 1975).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et février.

*Gambie* = résident et nicheur (entre juillet et octobre), peu nombreux.

#### 46. Canard siffleur

Eurasian Wigeon, Fischione - *Anas penelope* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen peu nombreux, présent entre novembre et mars.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 3 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 2 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 7 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen présent entre novembre et mars, commun surtout en janvier (n. max. 1984-1994: 420 en 1990-1991), et jusqu'au début de février.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = pas présent.

#### 47. Canard a front blanc

American Wigeon, Fischione americano – *Anas americana*

*Sénégal septentrional* = migrateur nordaméricain très rare, observé en février 1975.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = pas observé entre 1984 et 1994.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = pas présent.

#### 48. Canard chipeau

Gadwall, Canapiglia - *Anas strepera*

*Sénégal septentrional* = rare hivernant européen, présent entre janvier et mars.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = pas présent.



**Flamant rose (36)**

Greater Flamingo, Fenicottero rosa - *Phoenicopterus ruber*

#### 49. Sarcelle d'hiver

Green-winged Teal, Alzavola - *Anas crecca* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen commun localement entre octobre et mars, et surtout en janvier.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 41 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 5 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 2 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen commun entre novembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 1.500 en 1988-1989), et plus nombreux entre décembre et mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 4, Dakar 0.

*Gambie* = rare hivernant européen.

#### 50. Canard colvert

Mallard, Germano reale – *Anas platyrhynchos* \*\*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen, présent entre septembre et mars.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = rare migrateur européen, mais peut être que quelques observations soient d'exemplaires dérivant de l'élevage.

#### 51. Canard pilet

Northern Pintail, Codone – *Anas acuta* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen localement très commun, surtout en septembre-février.



*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 76.910 (83% du total) et Delta du Sénégal 15.150 en 2002; Djoudj 71.800 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 45.707 (99% du total) et Delta du Sénégal 120 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen très commun entre octobre et avril et surtout entre la fin d'octobre et le début de mars (n. max. 1984-1994: 240.984 en 1985-1986).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre septembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 185, Dakar 0.

*Gambie* = hivernant européen pas commun et irrégulier (n. max. env. 1.000 en décembre-janvier 1973-1974), présent entre décembre et février.



**Oie-armée de Gambie (43)**

Spur-winged Goose, Oca dallo sperone - *Plectropterus gambensis*

**Oie d'Égypte (41)**

Egyptian Goose, Oca egiziana - *Alopochen aegyptiacus*

## 52. Sarcelle d'été

Garganey, Marzaiola - *Anas querquedula* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun hivernant européen, surtout entre octobre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 30.765 (82% du total) et Delta du Sénégal 6.420 en 2002; Djoudj 28.391 (91% du total), Lac de Guier 520 et Delta du Sénégal 2.345 en 2003; Djoudj 8.968 (50% du total) et Delta du Sénégal 8.972 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen très commun en septembre-mai et surtout entre octobre et la fin de mai (n. max. 1984-1994: 180.202 en 1986-1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et mai.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 1, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen très commun (n. max. env. 5.000 en mars 1976), présent entre février et mars.

## 53. Sarcelle à ailes bleues

Blue-winged Teal, Marzaiola americana - *Anas discors*

*Sénégal septentrional* = migrateur nordaméricain rare, observé en mars.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur nordaméricain rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars.

*Gambie* = pas observé.

## 54. Canard souchet

Northern Shoveler, Mestolone – *Anas clypeata* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen, avec de fortes concentrations dans le Delta du Sénégal.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 6.639 (91% du total) et Delta du Sénégal 617 en 2002; Djoudj 10.729 (92% du total), Lac de Guier 190 et Delta du Sénégal 773 en 2003; Djoudj 282 (43% du total) et Delta du Sénégal 374 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen très commun en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 33.700 en 1985-1986).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.





*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 250, Dakar 0.

*Gambie* = hivernant européen peu nombreux et irrégulier.

## 55. Sarcelle marbrée

Marbled Teal, Anatra marmorizzata - *Marmaronetta angustirostris*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen d'hiver en petites nombres, surtout



**Tadorne de Belon (42)**

Common Shelduck, Tadorna – *Tadorna tadorna*

**Canard siffleur (46)**

Eurasian Wigeon, Fischione - *Anas penelope*

**Canard chipeau (48)**

Gadwall, Canapiglia - *Anas strepera*

**Sarcelle d'hiver (49)**

Green-winged Teal, Alzavola - *Anas crecca*

en décembre-février et dans le Djoudj.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare, nicheur avec 1 couple en 1979.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et mars-avril.

*Gambie* = pas observé.

### **56. Fuligule milouin**

Common Pochard, Moriglione - *Aythya ferina*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen pas commun, présent entre novembre et mars.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2004)* = Djoudj 28 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare en octobre-février et commun entre la fin de novembre et la moitié de février (n. max. 1984-1994: env. 1.500 en 1983-1984).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et février.

*Gambie* = rare migrateur européen.

### **57. Fuligule nyroca**

Ferruginous Duck, Moretta tabaccata – *Aythya nyroca*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen d'hiver, présent entre octobre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2004)* = Djoudj 10 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen présent entre novembre et février, peu commun (n. max. 1984-1994: env. 50 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et février.

*Gambie* = rare migrateur.

### **58. Fuligule morillon**

Tufted Duck, Moretta - *Aythya fuligula* \*\*





*Sénégal septentrional* = visiteur européen d'hiver localisé et pas commun, présent entre novembre et mars.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2004)* = Djoudj 2 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen présent en novembre-février, peu commun (n. max. 1984-1994: env. 50 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et février.

*Gambie* = rare migrateur européen.



**Canard colvert (50)**

Mallard, Germano reale – *Anas platyrhynchos*

**Sarcelle d'été (52)**

Garganey, Marzaiola - *Anas querquedula*

**Canard pilet (51)**

Northern Pintail, Codone – *Anas acuta*

**Canard souchet (54)**

Northern Shoveler, Mestolone – *Anas clypeata*

## PANDIONIDAE

### 59. Balbuzard pêcheur

Osprey, Falco pescatore – *Pandion haliaetus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur européen, présent surtout pendant la saison sèche, et résident pas commun.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 9 (24% du total) et Delta du Sénégal 28 en 2002; Djoudj 15 (33% du total), Lac de Guier 9 et Delta du Sénégal 21 en 2003; Djoudj 10 (17% du total) et Delta du Sénégal 47 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen présent en octobre-avril, fréquent (n. max. 1984-1994: 14 en février 1992), mais rarement observé avec plus de 5 exemplaires.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 415, Petite Côte 37, Dakar 4.

*Gambie* = hivernant européen (avec 100-200 exemplaires), présent entre septembre et avril.

## ACCIPITRIDAE

### 60. Bondrée apivore

European Honey Buzzard, Falco pecchiaiolo – *Pernis apivorus*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas commun.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen peu nombreux (n. max. 1984-1994: 2 en février-mars 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et mars.

*Gambie* = rare migrateur et hivernant européen, présent surtout entre novembre et avril.

### 61. Élanion blanc

Black-shouldered Kite, Nibbio bianco - *Elanus caeruleus* \*\*



*Sénégal septentrional* = résident pas commun, et plus nombreux au début de la saison sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 1 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 1 en 2003; pas observé dans le Delta du Sénégal en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: 12 en décembre 1988) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre août et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 15,



**Fuligule milouin (56)**

Common Pochard, Moriglione - *Aythya ferina*

**Fuligule nyroca (57)**

Ferruginous Duck, Moretta tabaccata - *Aythya nyroca*

**Fuligule morillon (58)**

Tufted Duck, Moretta - *Aythya fuligula*

Petite Côte 5, Dakar 2.

*Gambie* = migrateur intra-africain pendant la saison sèche, commun pendant quelques années et peu nombreux en autres, et probable nicheur.

### **62. Élanion naucleur**

Swallow-tailed Kite, Nibbio coda di forbice - *Chelictina riocourii*

*Sénégal septentrional* = migrateur localement commun, vers le sud pendant la saison sèche et vers le nord au début de la saison des pluies, pour la nidification.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux en décembre-février (n. max. 1984-1994: 158 en janvier 1994, dans un essaim de locustes).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 138, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur intra-africain pendant la saison sèche, entre décembre et juin.

### **63. Milan noir**

Black Kite, Nibbio bruno – *Milvus migrans* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen présent entre septembre et décembre, et résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical et migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: env. 500 en février 1994, pendant une invasion de locustes).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.350, Petite Côte 107, Dakar 1.350.

*Gambie* = hivernant européen, commun migrateur intra-africain pendant la saison sèche en octobre-avril, et nicheur peu nombreux, en avril-mai.

### **64. Pygargue vocifer**

River Eagle, Aquila pescatrice africana - *Haliaeetus vocifer* \*\*


*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 8 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 11 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 6 (75% du total) et Delta du Sénégal 2 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical nicheur (3 couples) et fréquent.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = delta du Sine-Saloum 3, Petite Côte 0, Dakar 0.



**Balbuzard pêcheur (59)**

Osprey, Falco pescatore – *Pandion haliaetus*

**Bondrée apivore (60)**

European Honey Buzzard, Falco pecchiaiolo – *Pernis apivorus*

**Milan noir (63)**

Black Kite, Nibbio bruno – *Milvus migrans*

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre octobre et mars.

#### **65. Vautour percnoptère**

Egyptian Vulture, Capovaccaio - *Neophron percnopterus*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical (douteux) et migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain, observé seulement entre décembre et juin.

#### **66. Vautour charognard**

Hooded Vulture, Capovaccaio pileato - *Necrosyrtes monachus* \*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars et décembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 43, Petite Côte 1, Dakar 47.

*Gambie* = résident très commun et nicheur, entre novembre et mars.

#### **67. Vautour africain**

African White-backed Vulture, Grifone africano - *Gyps africanus*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun, moins nombreux pendant la saison des pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare, observé en mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 65, Petite Côte 9, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre novembre et juin.

#### **68. Vautour de Rüppell**

Rüppell's Griffon Vulture, Grifone di Rüppell - *Gyps rueppelli*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et mars.


*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2, Petite Côte 15, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur, entre décembre et mars.

#### **69. Vautour fauve**

European Griffon Vulture, Grifone eurasiatico - *Gyps fulvus* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen peu nombreux entre la fin d'octobre



**Pygargue vocifer (64)**

River Eagle, Aquila pescatrice africana - *Haliaeetus vocifer*

et le début de mai.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et novembre.

*Gambie* = pas présent.

#### **70. Circaète Jean-le-Blanc**

Short-toed Snake Eagle, Biancone – *Circaetus gallicus*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen présent surtout entre décembre et avril, pas commun. Jusqu'à 3 exemplaires pendant l'hivernage.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 9, Petite Côte 2, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen, régulier mais peu nombreux, entre août et avril et surtout en octobre.

#### **71. Circaète de Beaudouin**

Brown Snake Eagle, Biancone bruno - *Circaetus cinereus*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun, et moins fréquent pendant les pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et mars.

*Gambie* = résident pas commun, plus nombreux entre décembre et avril.

#### **72. Busard pâle**

Pallid Harrier, Albanella pallida – *Circus macrourus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur éurasiatique localement pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur éurasiatique pas commun, présent en novembre-mars et rarement en plus que 4 exemplaires.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = migrateur et hivernant éurasiatique peu nombreux, présent entre octobre et mai.



#### **73. Busard cendré**

Montagu's Harrier, Albanella minore - *Circus pygargus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen peu nombreux, et localement plus fréquent.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2004)* = Djoudj 1 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen commun en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 160 en février 1992, dans un dortoir-



**Circaète Jean-le-Blanc (70)**

Short-toed Snake Eagle, Biancone – *Circaetus gallicus*

**Vautour fauve (69)**

European Griffon Vulture, Grifone eurasiatico - *Gyps fulvus*

reposer) et pas commun avant novembre.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 73, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare hivernant européen, présent entre janvier et mars.

#### **74. Busard des roseaux**

Eurasian Marsh Harrier, Falco di palude – *Circus aeruginosus* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen et rare hivernant, plus nombreux au début de la saison sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 17 (94% du total) et Delta du Sénégal 1 en 2002; Djoudj 77 (100% du total dans le Delta du Sénégal en 2003; Djoudj 23 (85% du total) et Delta du Sénégal 4 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen commun surtout entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 390 en janvier 1993, dans un dortoir-reposoir).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 40, Petite Côte 9, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent migrateur et hivernant européen, présent entre septembre et avril et surtout en octobre.

#### **75. Autour sombre**

Dark Chanting Goshawk, Astore canoro scuro - *Melierax metabates*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afro-tropical pas commun, présent surtout entre décembre et mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur, en février-juillet.

#### **76. Buse variable**

Common Buzzard, Poiana – *Buteo buteo* \*\*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et février.

*Gambie* = rare, observé entre novembre et janvier.

#### **77. Buse féroce**

Long-legged Buzzard, Poiana coda bianca - *Buteo rufinus*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, présent entre octobre et mars.



**Vautour de Rüppell (68)**

Rüppell's Griffon Vulture, Grifone di Rüppell - *Gyps rueppelli*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et février.  
*Gambie* = rare, observé en décembre et janvier.

### **78. Aigle ravisseur**

Tawny Eagle, Aquila rapace - *Aquila rapax* \*\*  
*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux, en récent réduction numérique.  
**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux.  
*Gambie* = résident et nicheur commun.

### **79. Aigle de Wahlberg**

Wahlberg's Eagle, Aquila di Wahlberg - *Aquila wahlbergi*  
*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur intra-africain, plus nombreux pendant la saison sèche.  
**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et mars.  
*Gambie* = résident et nicheur peu nombreux.

### **80. Aigle de Bonelli**




Bonelli's Eagle, Aquila del Bonelli – *Hieraaetus fasciatus*  
*Sénégal septentrional* = rare migrateur et hivernant européen dans le Parc du Djoudj.  
**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen présent en novembre-avril, pas commun.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et mars.  
*Gambie* = pas présent.

### **81. Aigle fascié**

African Hawk Eagle, Aquila minore africana - *Hieraaetus spilogaster*  
*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux, et moins fréquent à la fin de la saison des pluies.  
**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.  
*Gambie* = rare résident et nicheur, entre décembre et avril.

### **82. Aigle botté**

Booted Eagle, Aquila minore eurasiatica - *Hieraaetus pennatus*  
*Sénégal septentrional* = migrateur éurasiatique pas commun.  
**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur éurasiatique peu nombreux.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars et avril.  
*Gambie* = probable hivernant éurasiatique irrégulier, présent entre juillet et mars.



**Busard pâle (72)**

Pallid Harrier, *Albanella pallida* – *Circus macrourus*

**Busard cendré (73)**

Montagu's Harrier, *Albanella minore* - *Circus pygargus*

**Busard des roseaux (74)**

Eurasian Marsh Harrier, *Falco di palude* – *Circus aeruginosus*

**Buse variable (76)**

Common Buzzard, *Poiana* – *Buteo buteo*

### 83. Aigle martial

Martial Eagle, Aquila marziale - *Polemaetus bellicosus*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et en récente forte réduction numérique.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = rare résident, mais sans observations récentes de nidification.

## FALCONIDAE

### 84. Faucon crécerellette

Lesser Kestrel, Grillaio - *Falco naumanni* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, présent entre septembre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 1 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en octobre-mars et surtout en janvier-février (n. max. 1984-1994: env. 3.200 en janvier 1994, dans un essaim de locustes).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 51, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare et irrégulier hivernant et migrateur européen, présent surtout entre décembre et mars.

### 85. Faucon crécerelle

Common Kestrel, Gheppio – *Falco tinnunculus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen commun.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen fréquent en octobre-avril (n. max. 1984-1994: supérieur à 100 en janvier 1994, dans un essaim de locustes).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 16, Petite Côte 4, Dakar 3.


*Gambie* = fréquent hivernant européen, présent entre novembre et avril et plus nombreux en décembre-janvier.

### 86. Faucon ardoisé

Grey Kestrel, Gheppio ardesia - *Falco ardosiaceus*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.



**Aigle botté (82)**

Booted Eagle, *Aquila minore eurasiatica* - *Hieraaetus pennatus*

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 5, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur.

### **87. Faucon chiquera**

Red-necked Falcon, *Falco testa rossa* - *Falco chicquera*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 3).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident et nicheur peu nombreux.

### **88. Faucon hobereau**

Eurasian Hobby, *Lodolaia* - *Falco subbuteo*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen peu nombreux.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et mars.

*Gambie* = migrateur européen régulier et peu nombreux, présent surtout en novembre et avril, et quelques fois hivernant.

### **89. Faucon lanier**

Lanner, Lanario - *Falco biarmicus*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et migrateur.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical et migrateur européen pas commun, présent en novembre-janvier.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et janvier.

*Gambie* = migrateur intra-africain peu nombreux.

### **90. Faucon pèlerin**

Peregrine, Pellegrino – *Falco peregrinus*



*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun.

***Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*** = Djoudj 1 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 1 (50% du total) et Delta du Sénégal 1 en 2003; pas observé dans le Delta du Sénégal en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen fréquent, présent en novembre-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6,



**Falcon crécerellette (84)**

Lesser Kestrel, Grillaio - *Falco naumanni*

**Falcon crécerelle (85)**

Common Kestrel, Gheppio - *Falco tinnunculus*

**Falcon hobereau (88)**

Eurasian Hobby, Lodolaio - *Falco subbuteo*

**Falcon pèlerin (90)**

Peregrine, Pellegrino - *Falco peregrinus*

Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen rare et irrégulier, présent surtout entre novembre et février.

### 91. Faucon de Barbarie

Barbary Falcon, Falco di Barberia - *Falco pelegrinoides*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = quelques observations récentes, entre décembre et mars.

## PHASIANIDAE

### 92. Caille des blés

Common Quail, Quaglia – *Coturnix coturnix*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas commun, présent en octobre-novembre et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = hivernant européen rare et irrégulier, présent entre novembre et février.

### 93. Caille arlequin

Harlequin Quail, Quaglia arlecchino - *Coturnix delegorguei*

*Sénégal septentrional* = migrateur intra-africain très rare, présent entre novembre et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = pas observé.

### 94. Francolin à double éperon

Double-spurred Francolin, Francolino dal doppio sperone - *Francolinus bicalcaratus*


*Sénégal septentrional* = résident commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 4), fréquent en 1991-1992, et probablement nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 31, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur.



**Caille des blés (92)**

Common Quail, Quaglia – *Coturnix coturnix*

**Marouette ponctuée (97)**

Spotted Crake, Voltolino - *Porzana porzana*

**Marouette poussin (98)**

Little Crake, Schiribilla - *Porzana parva*

**Poule d'eau (102)**

Moorhen, Gallinella d'acqua – *Gallinula chloropus*

**Foulque macroule (103)**

Eurasian Coot, Folaga – *Fulica atra*

## TURNICIDAE

### 95. Turnix d'Andalousie

Little Button-quail, Quaglia tridattila - *Turnix sylvatica*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain peu nombreux.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et mars.

*Gambie* = rare résident et nicheur, plus nombreux entre novembre et février.

## RALLIDAE

### 96. Rôle des prés

African Crake, Schiribilla africana - *Crex egregia*

[syn. *Crexopsis egregia*]

*Sénégal septentrional* = migrateur intra-africain très rare, niche pendant la saison des pluies.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = résident et possible nicheur, peu nombreux.

### 97. Marouette ponctuée

Spotted Crake, Voltolino - *Porzana porzana*

*Sénégal septentrional* = commun hivernant européen dans le Delta du Sénégal, entre novembre et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en janvier-mars, et exceptionnellement commun en janvier-février 1987 (n. max. 1984-1994: quelques centaines).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre janvier et mars.

*Gambie* = rare migrateur européen.

### 98. Marouette poussin

Little Crake, Schiribilla - *Porzana parva*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen d'hiver, présent entre octobre et janvier.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en décembre-avril (n. max. 1984-1994: 3 en janvier 1992).



*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et avril.

*Gambie* = observé la première fois en décembre 1998.

### 99. Marouette noire

Black Crake, Gallinella nera - *Amaurornis flavirostris* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident commun.



**Talève sultane (101)**

Purple Swampen, Pollo sultano – *Porphyrio porphyrio*

**Turnix d'Andalousie (95)**

Little Botton-quail, Quaglia tridattila – *Turnix sylvatica*

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 18 (38% du total) et Delta du Sénégal 29 en 2002; Djoudj 8  
(73% du total) et Lac de Guier 3 en 2003; Djoudj 7 (39% du total), Lac  
de Guier 2 et Delta du Sénégal 9 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-  
1994: 4), mais rare en 1990-1991, et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = commun résident.

### **100. Talève d'Allen**

Allen's Gallinule, Pollo sultano di Allen - *Porphyrio alleni*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain, pas commun.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent en janvier et mars.

*Gambie* = probable résident, rare.

### **101. Talève sultane**

Purple Swamphen, Pollo sultano – *Porphyrio porphyrio* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun, surtout en mai-juin.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 87 (88% du total) et Delta du Sénégal 12 en 2002; Djoudj 202  
(98% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 3 en 2003; Djoudj 33  
(32% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 60 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical commun, peu nombreux  
jusqu'à janvier (n. max. 1984-1994: env. 550 en janvier 1991), et  
nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = rare et irrégulier migrateur pendant la saison sèche, et présent surtout  
entre avril et août.

### **102. Poule d'eau**

Moorhen, Gallinella d'acqua – *Gallinula chloropus* \*\*





*Sénégal septentrional* = rare résident et fréquent migrateur européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 10 (28% du total) et Delta du Sénégal 25 en 2002; Djoudj 56  
(93% du total) et Delta du Sénégal 4 en 2003; Djoudj 13 (32% du total),  
Lac de Guier 2 et Delta du Sénégal 25 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical et migrateur européen plus  
commun entre octobre et avril (n. max. 1984-1994: env. 250 en février  
1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = résident, migrateur intra-africain ou européen et hivernant européen,



**Échasse blanche (109)**

Black-winged Stilt, Cavaliere d'Italia – *Himantopus himantopus*

**Avocette (110)**

Pied Avocet, Avocetta – *Recurvirostra avosetta*

**Oedicnème criard (111)**

Stone Curlew, Occhione – *Burhinus oedicnemus*

**Courvite isabelle (115)**

Cream-coloured Courser, Corrione biondo - *Cursorius cursor*

**Glaréole à collier (117)**

Pratincole, Pernice di mare - *Glareola pratincola*

plus fréquent entre novembre et avril.

### 103. Foulque macroule

Eurasian Coot, Folaga – *Fulica atra*

*Sénégal septentrional* = visiteur d'hiver européen localement commun, avec 2 couples de nicheurs en 2001 dans le nord du Sénégal.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2003 et 2004)* = Djoudj 2 (100% du total de le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 11 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun, présent surtout entre novembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 450 en 1987-1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre octobre et avril.

*Gambie* = première observation en février 1994..

## GRUIDAE

### 104. Grue couronnée

Black Crowned Crane, Gru pavonina - *Balearica pavonina* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement fréquent et nicheur.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 58 (100% du total de le Delta du Sénégal) en 2002; Djoudj 115 (97% du total) et Delta du Sénégal 4 en 2003; Djoudj 34 (42% du total) et Delta du Sénégal 47 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical commun surtout entre janvier et avril (n. max. 1984-1994: env. 350 en janvier 1994) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = résident et nicheur pas commun (n. max. 110 en juillet 1976).

## OTIDIDAE

### 105. Outarde arabe




Arabian Bustard, Otarda araba - *Ardeotis arabs* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain, aujourd'hui pas commun., mais localement fréquent jusqu'à 1960.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 10 en octobre 1991), mais rarement avec plus que 5 oiseaux présents.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = rare migrateur.



**Grand gravelot (119)**

Ringed Plover, Corriere grosso - *Charadrius hiaticula*

**Petit gravelot (118)**

Little Ringed Plover, Corriere piccolo - *Charadrius dubius*

**Gravelot à collier interrompu (121)**

Kentish Plover, Fratino - *Charadrius alexandrinus*

### 106. Outarde du Sénégal

White-bellied Bustard, Otarda del Senegal - *Eupodotis senegalensis*  
*Sénégal septentrional* = fréquent résident, migre vers le nord pendant la saison des pluies; en recent forte reduction numérique.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 5).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = rare migrateur, commun jusqu'à 1960.

## JACANIDAE

### 107. Jacana à poitrine dorée

Lilytrotter, Jacana africana - *Actophilornis africana* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun, moins nombreux à la fin de la saison sèche.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 352 (98% du total) et Delta du Sénégal 7 en 2002; Djoudj 452 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 101 (80% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 24 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun (n. max. 1984-1994: env. 200 en janvier 1992) et probablement nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 0, Dakar 2.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre juin et décembre.

## ROSTRATULIDAE

### 108. Rhynchée peinte

Painted Snipe, Beccaccia dorata maggiore - *Rostratula benghalensis*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et migrateur intra-africain.


*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 4 (67% du total) et Delta du Sénégal 2 en 2002; Djoudj 3 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 11 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 17 en février 1991).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 3, Dakar 0.

*Gambie* = peu nombreux et présent surtout pendant la saison sèche.



**Rhynchée peinte (108)**

Painted Snipe, Beccaccia dorata maggiore - *Rostratula benghalensis*

## RECURVIROSTRIDAE

### 109. Échasse blanche

Black-winged Stilt, Cavaliere d'Italia – *Himantopus himantopus* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident local et visiteur européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 186 (30% du total) et Delta du Sénégal 438 en 2002; Djoudj 155 (22% du total), Lac de Guier 12 et Delta du Sénégal 543 en 2003; Djoudj 107 (16% du total), Lac de Guier 22 et Delta du Sénégal 527 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical et migrateur européen commun (n. max. 1984-1994: env. 200 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 546, Petite Côte 516, Dakar 40.

*Gambie* = commun migrateur européen, peu nombreux pendant l'hiver.

### 110. Avocette

Pied Avocet, Avocetta – *Recurvirostra avosetta* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen (présent surtout en août-mars), avec quelques présences pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)* = Djoudj 187 (8% du total) et Delta du Sénégal 2.205 en 2002; Djoudj 6 (0,1% du total), Lac de Guier 11 et Delta du Sénégal 4.335 en 2003; Djoudj 6 (0,1% du total) et Delta du Sénégal 4.254 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen très commun surtout en novembre-avril, (n. max. 1984-1994: 3.050 en février 1990), peu nombreux jusqu'à la fin de décembre.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.511, Petite Côte 34, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen peu nombreux en février-avril et moins fréquent en septembre-décembre (n. max. env. 60 en janvier 1989).

## BURHINIDAE

### 111. Oedicnème criard



Stone Curlew, Occhione – *Burhinus oedicnemus*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = décembre.

*Gambie* = pas présent.



**Pluvier doré (122)**

European Golden Plover, Piviere dorato - *Pluvialis apricaria*

**Pluvier argenté (123)**

Grey Plover, Pivieressa- - *Pluvialis squatarola*

**Vanneau huppé (127)**

Northern Lapwing, Pavoncella – *Vanellus vanellus*

### 112. Oedicnème du Sénégal

Senegal Thick-knee, Occhione del Senegal - *Burhinus senegalensis* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et migrateur intra-africain.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2203 et 2004)*  
= Djoudj 48 (63% du total) et Delta du Sénégal 28 en 2002; Djoudj 30  
(30% du total) et Delta du Sénégal 70 en 2003; Djoudj 24 (53% du total),  
Lac de Guier 7 et Delta du Sénégal 14 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical commun (n. max. 1984-  
1994: 70 dans un dortoir-reposoir diurne).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 155,  
Petite Côte 35, Dakar 7.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre janvier et juillet, mais surtout en  
avril-mai.

### 113. Oedicnème tachard

Spotted Thick-knee, Occhione del Capo - *Burhinus capensis* \*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et nicheur entre avril et juillet.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1,  
Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = pas commun, nicheur probable.

## GLAREOLIDAE

### 114. Pluvian fluviatile

Egyptian Plover, Guardiano del cocodrillo - *Pluvianus aegyptius*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent localement, et migrateur intra-africain.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical peu nombreux, plus fréquent  
pendant la saison des pluies.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = août-septembre et novembre.



*Gambie* = migrateur intra-africain pendant la saison sèche, présent entre juin et  
février et plus nombreux entre septembre et décembre.

### 115. Courvite isabelle

Cream-coloured Courser, Corrione biondo - *Cursorius cursor*

*Sénégal septentrional* = migrateur éurasiatique pas commun, présent entre août  
et mai, et résident.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002 et 2003)* = Djoudj  
0 et Delta du Sénégal 8 en 2002; Djoudj 2 (20% du total) et Delta du



**Vanneau éperonné (126)**

Spur-winged Lapwing, Pavoncella spinosa - *Vanellus spinosus*

**Pluvian fluviatile (114)**

Egyptian Plover, Guardiano del cocodrillo – *Pluvianus aegyptius*

Sénégal 8 en 2003.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical et migrateur européen pas commun entre novembre et avril, normalement en couples ou en petits groupes (n. max. 1984-1994: 17 en février 1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre octobre et avril.

*Gambie* = rare migrateur, observé entre décembre et février.

### 116. Courvite de Temminck

Temminck's Courser, Corrione di Temminck - *Cursorius temminckii* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = décembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 9, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident et nicheur pas commun, plus fréquent entre décembre et juin.

### 117. Glaréole à collier

Pratincole, Pernice di mare - *Glareola pratincola* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident local pas commun, migrateur intra-africain et migrateur éurasiatique.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 2 (2% du total) et Delta du Sénégal 111 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 14 en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 463 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical et migrateur éurasiatique très commun (n. max. 1984-1994: env. 1.650 en janvier 1994, dans un essaim de locustes), plus fréquent à la fin d'août et entre novembre et avril, et nicheur entre mai et juillet.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent migrateur et hivernant éurasiatique (n. max. env. 2.000 pendant la migration en février) et nicheur probable, observé pendant toute l'année sauf octobre.

## CHARADRIIDAE

### 118. Petit gravelot

Little Ringed Plover, Corriere piccolo - *Charadrius dubius* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen commun, surtout entre octobre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 183 en 2002; Djoudj 3 (43% du total) et

Delta du Sénégal 4 en 2003; Djoudj 2 (25% du total) et Delta du Sénégal 6 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 20 en avril 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 3, Petite Côte 7, Dakar 3.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen peu nombreux entre août et mai, plus fréquent entre novembre et mars (n. max. env. 50 en novembre 1977) et surtout en décembre-janvier.

### 119. Grand gravelot

Ringed Plover, Corriere grosso - *Charadrius hiaticula* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen fréquent, surtout entre septembre et mai.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 16 (4% du total) et Delta du Sénégal 392 en 2002; Djoudj 4 (3% du total), Lac de Guier 2 et Delta du Sénégal 146 en 2003; Djoudj 11 (2% du total), Lac de Guier 13 et Delta du Sénégal 465 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 40 en décembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6.036, Petite Côte 735, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen commun entre août et avril, et plus fréquent en septembre-octobre et mars, mais présent toute l'année en petits groupes.

### 120. Gravelot pâtre

Kittlitz's Plover, Corriere di Kittlitz - *Charadrius pecuarius* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et migrateur intra-africain.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 70 (83% du total) et Delta du Sénégal 14 en 2002; Djoudj 2 (33% du total) et Delta du Sénégal 6 en 2003; Djoudj 7 (50% du total) et Delta du Sénégal 7 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 50 en février 1993) nicheur, entre février et juillet.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 126, Petite Côte 238, Dakar 0.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain pendant la saison sèche, entre octobre et avril.

### 121. Gravelot à collier interrompu

Kentish Plover, Fratino - *Charadrius alexandrinus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux, et migrateur européen commun, présent surtout entre septembre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 1 (1% du total) et Delta du Sénégal 63 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 23 en 2003; Djoudj 5 (45% du total) et Delta du Sénégal 6 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical et migrateur européen fréquent, plus nombreux en février-mars (n. max. 1984-1994: env. 30 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.343, Petite Côte 31, Dakar 0.

*Gambie* = visiteur peu nombreux pendant l'hiver, plus fréquent entre décembre et février et moins nombreux entre mai et septembre.

### 122. Pluvier doré

European Golden Plover, Piviere dorato - *Pluvialis apricaria*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et février.

*Gambie* = rare migrateur européen, observé entre octobre et mai.

### 123. Pluvier argenté

Grey Plover, Pivieressa- - *Pluvialis squatarola* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen fréquent surtout entre octobre et avril et près de la côte.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 9 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 40 en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 2 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen présent en novembre-mars, pas commun (n. max. 1984-1994: 6 en 1991-1992) et absent pendant quelques années.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4.358, Petite Côte 129, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen, commun surtout entre septembre-octobre et mars (n. max. env. 30), avec de rares présences toute l'année.

### 124. Vanneau du Sénégal

Senegal Wattled Lapwing, Pavoncella del Senegal - *Vanellus senegallus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain pas commun.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 6 en 2002; pas observé en 2003; Djoudj 2 (22% du total) et Delta du Sénégal 7 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 8, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre octobre et juillet, moins nombreux à la fin de la saison sèche.

### 125. Vanneau à tête noire

Black-headed Lapwing, Pavoncella testa nera - *Vanellus tectus* \*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare, mais fréquent autour du Parc.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 47, Petite Côte 4, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident (n. max. env. 30) et nicheur, entre janvier et juillet et surtout en mai-juin, plus fréquent au début de la saison sèche.

### 126. Vanneau éperonné

Spur-winged Lapwing, Pavoncella spinosa - *Vanellus spinosus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 23 (16% du total) et Delta du Sénégal 118 en 2002; Djoudj 18 (12% du total), Lac de Guier 19 et Delta du Sénégal 58 en 2003; Djoudj 48 (20% du total), Lac de Guier 22 et Delta du Sénégal 184 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun afrotropical (n. max. 1984-1994: 69 en janvier 1994), nicheur (avec 21 couples en novembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.222, Petite Côte 242, Dakar 112.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre décembre et juillet, plus fréquent au début de la saison sèche.

### 127. Vanneau huppé

Northern Lapwing, Pavoncella – *Vanellus vanellus*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur, présent entre novembre et février et surtout en janvier.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen ou nordafricain pas

commun (n. max. 1984-1994: 5 en février 1993).  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.  
*Gambie* = rare migrateur européen ou nordafricain.

## SCOLOPACIDAE

### 128. Bécasseau maubèche

Red Knot, Piovanello maggiore - *Calidris canutus*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen rare, présent surtout entre septembre et avril et près de la côte.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)*  
= Djoudj 0 et Delta du Sénégal 19 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 24 en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 41 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = rare migrateur européen.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.480, Petite Côte 63, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen pas commun en octobre-novembre et février-mars, et hivernant européen peu nombreux (n. max. env. 150 en décembre 1975).

### 129. Bécasseau minute

Little Stint, Gambecchio - *Calidris minuta* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen commun surtout en septembre-avril, mais présent toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)*  
= Djoudj 37 (2% du total) et Delta du Sénégal 1.702 en 2002; Djoudj 77 (0,8% du total) et Delta du Sénégal 9.930 en 2003; Djoudj 67 (8% du total), Lac de Guier 77 et Delta du Sénégal 701 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen commun entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: plus que 3.000 en mars-avril 1991).






*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 14.180, Petite Côte 1.843, Dakar 1.

*Gambie* = migrateur européen très commun (n. max env. 300) en octobre-novembre et février-avril, et hivernant européen moins nombreux mais plus fréquent entre octobre et février.

### 130. Bécasseau de Temminck

Temminck's Stint, Gambecchio nano - *Calidris temminckii* \*\*



**Bécasseau minute (129)**

Little Stint, Gamberchio - *Calidris minuta*

**Bécasseau de Temminck (130)**

Temminck's Stint, Gamberchio nano - *Calidris temminckii*

**Bécasseau cocorli (132)**

Curlew Sandpiper, Piovanello - *Calidris ferruginea*

**Bécasseau variable (133)**

Dunlin, Piovanello pancianera - *Calidris alpina*

**Chevalier combattant (134)**

Ruff, Combattente - *Philomachus pugnax*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, présent surtout entre septembre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 1 en 2002; pas observé en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 1 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun en octobre-avril (n. max. 1984-1994: 5 en février 1992), peu nombreux jusqu'à décembre.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 1, Dakar 0.

*Gambie* = rare migrateur et hivernant européen, observé entre octobre et mai.

### 131. Bécasseau à poitrine cendrée

Pectoral Sandpiper, Piro piro pettorale - *Calidris melanotos*

*Sénégal septentrional* = migrateur nordaméricain et sibérien rare mais régulier, observé entre octobre et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = rare migrateur nordaméricain.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = avril.

*Gambie* = pas présent.

### 132. Bécasseau cocorli

Curlew Sandpiper, Piovanello - *Calidris ferruginea* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen, fréquent surtout en août-avril et près de la côte; quelques présences pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 2 (2% du total) et Delta du Sénégal 97 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 41 en 2003; Djoudj 1 (0,7% du total) et Delta du Sénégal 140 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 150 en décembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 12.422, Petite Côte 3.087, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen commun (n. max. env. 50) entre septembre et mai, plus fréquent en septembre-octobre et mars et surtout entre novembre et février.

### 133. Bécasseau variable

Dunlin, Piovanello pancianera - *Calidris alpina* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen, présent surtout en septembre-avril et, avec quelques exemplaires, toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 172 (35% du total) et Delta du Sénégal 322 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 354 en 2003; Djoudj 27 (2% du total), Lac de Guier 39 et Delta du Sénégal 1.065 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen fréquent en octobre-avril (n. max. 1984-1994: 89 en mars 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 22, Petite Côte 52, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent migrateur et hivernant européen présent entre août et avril, et surtout en novembre-décembre (n. max. env. 200 en novembre), mais normalement observé en groupes de 10-30.

### **134. Chevalier combattant**

Ruff, Combattente – *Philomachus pugnax* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen commun, surtout entre septembre et avril, avec quelques présences pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 588 (60% du total) et Delta du Sénégal 393 en 2002; Djoudj 431 (65% du total), Lac de Guier 20 et Delta du Sénégal 215 en 2003; Djoudj 552 (19% du total), Lac de Guier 202 et Delta du Sénégal 2.090 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen très commun entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 700.000-1.000.000 en mars 1972 en dortoirs-reposoirs).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.902, Petite Côte 549, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen très commun, entre la fin de juillet et la fin d'avril, et plus fréquent en septembre-octobre et surtout entre novembre et mars (n. max. env. 5.000 en janvier-mars).

### **135. Bécassine sourde**

Jack Snipe, Frullino – *Lymnocyptes minimus*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen d'hiver (surtout entre novembre et mars).

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen pas commun en novembre-mars (n. max. 1984-1994: 12 en février 1987), plus fréquent entre février et la moitié de mars, et moins nombreux pendant quelques années.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = rare hivernant européen, observé entre novembre et février.

### 136. Bécassine des marais

Common Snipe, Beccaccino – *Gallinago gallinago* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen, présent surtout entre septembre et mars.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 7 (54% du total) et Delta du Sénégal 6 en 2002; Djoudj 11 (85% du total) et Delta du Sénégal 2 en 2003; Djoudj 23 (88% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 2 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen fréquent en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 20 en janvier 1991), peu nombreux pendant quelques années.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 2, Dakar 0.

*Gambie* = hivernant européen fréquent (n. max. env. 40 en janvier 1966) entre septembre et mai, et plus nombreux entre novembre et janvier.

### 137. Barge à queue noire

Black-tailed Godwit, Pittima reale - *Limosa limosa* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur européen, présent surtout entre septembre et avril, mais avec quelques exemplaires pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 207 (19% du total) et Delta du Sénégal 887 en 2002; Djoudj 862 (75% du total), Lac de Guier 105 et Delta du Sénégal 176 en 2003; Djoudj 109 (16% du total), Lac de Guier 4 et Delta du Sénégal 578 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen très commun entre septembre et avril et surtout en novembre-février (n. max. 1984-1994: env. 6.000 en novembre 1987 dans un dortoir-reposoir), et peu nombreux jusqu'à la fin d'août.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.






*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 126, Petite Côte 58, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen très commun en août-septembre et présent entre octobre et janvier (n. max. env. 800 en novembre), mais rare pour le restant de l'année.

### 138. Barge rousse

Bar-tailed Godwit, Pittima minore - *Limosa lapponica* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, présent surtout en septembre-avril et près de la côte.



**Bécassine sourde (135)**

Jack Snipe, Frullino – *Lymnocyptes minimus*

**Bécassine des marais (136)**

Common Snipe, Beccaccino – *Gallinago gallinago*

**Barge à queue noire (137)**

Black-tailed Godwit, Pittima reale - *Limosa limosa*

**Courlis corlieu (139)**

Whimbrel, Chiurlo piccolo - *Numenius phaeopus*

**Courlis cendré (140)**

Eurasian Curlew, Chiurlo maggiore – *Numenius arquata*

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)*  
= Djoudj 0 et Delta du Sénégal 20 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal  
32 en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 1 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun en  
octobre-avril (n. max. 1984-1994: 5), peu nombreux dans la majorité des  
années.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 3.768,  
Petite Côte 33, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen rare pendant toute l'année et fréquent  
entre octobre et mars et commun en juillet, avec la présence régulière de  
groupes jusqu'à 400 exemplaires chacun.

### 139. Courlis corlieu

Whimbrel, Chiurlo piccolo - *Numenius phaeopus* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen fréquent surtout en août-avril et près  
de la côte.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* =  
Djoudj 0 et Delta du Sénégal 4 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 7  
en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 10 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux en  
août-avril (n. max. 1984-1994: 2).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4.847,  
Petite Côte 39, Dakar 2.

*Gambie* = commun migrateur et hivernant européen, présent entre août et avril, et  
rare pendant toute l'année.

### 140. Courlis cendré

Eurasian Curlew, Chiurlo maggiore – *Numenius arquata* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, présent surtout entre  
août et avril, avec quelques exemplaires pendant toute l'année.


*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* =  
Djoudj 0 et Delta du Sénégal 6 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 5  
en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 4 en 2004.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux et  
présent surtout en août-mars (n. max. 1984-1994: 3).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.


*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.139,  
Petite Côte 7, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen pas commun (n. max. 12 en hiver),  
présent surtout entre décembre et mars et rare pendant toute l'année.



**Chevalier arlequin (141)**

Spotted Redshank, Totano moro - *Tringa erythropus*



**Chevalier gambette (142)**

Redshank, Pettegola - *Tringa totanus*

**Chevalier stagnatile (143)**

Marsh Sandpiper, Albastrello - *Tringa stagnatilis*

#### 141. Chevalier arlequin

Spotted Redshank, Totano moro - *Tringa erythropus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen commun, présent surtout entre octobre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 10 (67% du total) et Delta du Sénégal 5 en 2002; pas observé en 2003; Djoudj 4 (29% du total) et Delta du Sénégal 10 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen commun en octobre-avril et surtout entre janvier et la moitié d'avril (n. max. 1984-1994: env. 750 en avril 1993), et peu nombreux en octobre-novembre.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 5, Petite Côte 12, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen peu nombreux entre novembre et février-avril, et hivernant rare.

#### 142. Chevalier gambette

Redshank, Pettegola - *Tringa totanus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen fréquent surtout entre septembre et avril, avec quelques exemplaires pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 6 (22% du total) et Delta du Sénégal 21 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 14 en 2003; Djoudj 9 (33% du total), Lac de Guier 2 et Delta du Sénégal 16 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen fréquent surtout entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 200 en avril 1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.952, Petite Côte 26, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen commun, plus fréquent entre octobre et janvier et en mars et présent pendant toute l'année.





#### 143. Chevalier stagnatîle

Marsh Sandpiper, Albastrello - *Tringa stagnatilis* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen fréquent, surtout entre août et avril, avec quelques exemplaires pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 16 (22% du total) et Delta du Sénégal 36 en 2002; Djoudj 7 (27% du total) et Delta du Sénégal 19 en 2003; Djoudj 2 (10% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 16 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen, plus fréquent entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 50 en avril 1988).



**Chevalier aboyeur (144)**

Greenshank, Pantana - *Tringa nebularia*

**Chevalier culblanc (145)**

Green Sandpiper, Piro piro culbianco - *Tringa ochropus*

**Chevalier sylvain (146)**

Wood Sandpiper, Piro piro boschereccio - *Tringa glareola*

**Chevalier guignette (147)**

Common Sandpiper, Piro piro piccolo - *Actitis hypoleucos*

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 5, Petite Côte 54, Dakar 7.

*Gambie* = migrateur et visiteur européen pas commun en hiver, présent en août-avril et surtout entre octobre et mars (n. max. 12 en janvier-février).

#### **144. Chevalier aboyeur**

Greenshank, Pantana - *Tringa nebularia* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen, présent surtout entre août et avril, avec quelques exemplaires pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 8 (6% du total) et Delta du Sénégal 131 en 2002; Djoudj 3 (2% du total) et Delta du Sénégal 171 en 2003; Djoudj 14 (8% du total), Lac de Guier 3 et Delta du Sénégal 152 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen plus fréquent entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: 25 en décembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 917, Petite Côte 97, Dakar 2.

*Gambie* = commun migrateur européen, présent en septembre-avril et surtout en octobre-février.

#### **145. Chevalier culblanc**

Green Sandpiper, Piro piro culbianco - *Tringa ochropus* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen, plus nombreux entre septembre et avril, avec quelques exemplaires présent pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 10 (36% du total) et Delta du Sénégal 18 en 2002; Djoudj 27 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2003; Djoudj 22 (100% du total dans le Delta du Sénégal) en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen plus fréquent en septembre-avril (n. max. 1984-1994: 20 en avril 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 7, Petite Côte 3, Dakar 2.

*Gambie* = migrateur et visiteur européen peu nombreux en hiver, surtout en septembre-octobre et mars (n. max. 32 en mars 1981) et plus nombreux en janvier.

#### **146. Chevalier sylvain**

Wood Sandpiper, Piro piro boschereccio - *Tringa glareola* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen commun, surtout entre septembre et avril, avec quelques exemplaires présent pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 24 (49% du total) et Delta du Sénégal 25 en 2002; Djoudj 14 (39% du total) et Delta du Sénégal 22 en 2003; Djoudj 22 (26% du total), Lac de Guier 4 et Delta du Sénégal 59 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen plus commun entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: env. 50 en décembre 1987 et août 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6, Petite Côte 28, Dakar 8.

*Gambie* = commun migrateur et hivernant européen entre août et avril et présent toute l'année (n. max. env. 300 en mai 1975).

#### **147. Chevalier guignette**

Common Sandpiper, Piro piro piccolo – *Actitis hypoleucos* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur européen, présent surtout entre août et avril, mais avec quelques présences pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 13 (19% du total) et Delta du Sénégal 55 en 2002; Djoudj 6 (27% du total) et Delta du Sénégal 16 en 2003; Djoudj 10 (22% du total), Lac de Guier 2 et Delta du Sénégal 34 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen fréquent surtout entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: 12 en février 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 85, Petite Côte 13, Dakar 2.

*Gambie* = migrateur européen commun entre août et avril, plus nombreux en novembre-avril et présent toute l'année.

#### **148. Tournepietre à collier**

Ruddy Turnstone, Voltapietre – *Arenaria interpres* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, présent surtout entre septembre et avril et près de la côte.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002 et 2003)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 21 en 2002; Djoudj 0, Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 10 en 2003; Djoudj 10 (22% du total), Lac de Guier 2 et Delta du Sénégal 34 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = rare migrateur européen.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et octobre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.996,

Petite Côte 20, Dakar 2.

*Gambie* = migrateur européen commun entre septembre et avril (n. max. env. 100 en janvier), plus fréquent entre octobre et mars, et présent toute l'année (n. max. env. 30 en juin 1976).

## LARIDAE

### 149. Mouette à tête grise

Grey-headed Gull, Gabbiano testa grigia - *Larus cirrhocephalus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident, présent sur et en proximité des fleuves.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 5.703 en 2002; Djoudj 0, Lac de Guier 7 et Delta du Sénégal 6.276 en 2003; Djoudj 3 (0,1% du total), Lac de Guier 9 et Delta du Sénégal 3.006 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 30 en août 1992 et en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.453, Petite Côte 330, Dakar 10.

*Gambie* = commun résident et probable nicheur, mais pas observé dans les dernières années.

### 150. Mouette rieuse

Black-headed Gull, Gabbiano comune - *Larus ridibundus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, présent surtout entre octobre et novembre et près de la côte, et peu nombreux pendant toute l'année.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 2 (10% du total) et Delta du Sénégal 18 en 2002; Djoudj 0 et Lac de Guier 26 en 2003; Djoudj 1 (5% du total) et Delta du Sénégal 19 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen fréquent en novembre-avril (n. max. 1984-1994: env. 120 en janvier 1994).




*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 38, Dakar 0.

*Gambie* = hivernant européen pas commun mais régulier entre novembre et mai (n. max. 15-20 en janvier 1975), plus nombreux en février.

### 151. Goéland railleur

Slender-billed Gull, Gabbiano roseo - *Larus genei* \*\*



**Mouette rieuse (150)**

Black-headed Gull, Gabbiano comune – *Larus ridibundus*

**Sterne pierregarin (157)**

Common Tern, Sterna comune – *Sterna hirundo*

**Sterne naine (158)**

Little Tern, Fraticello – *Sterna albifrons*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et nicheur en Sénégal, migrateur intra-africain et hivernant européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 671 en 2002; Djoudj 1 (0,03% du total) et Delta du Sénégal 3.712 en 2003; Djoudj 4 (0,4% du total) et Delta du Sénégal 1.043 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 200 en mars 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 9.086, Petite Côte 531, Dakar 0.

*Gambie* = visiteur pas commun mais régulier, entre novembre et juillet et plus nombreux à partir de janvier.

### **152. Goéland brun**

Lesser Black-backed Gull, Zafferano - *Larus fuscus* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun, avec quelques présences pendant l'été.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 1 (0,1% du total) et Delta du Sénégal 1.453 en 2002; Djoudj 1 (0,2% du total) et Delta du Sénégal 544 en 2003; Djoudj 1 (0,1% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 976 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en septembre-avril (n. max. 1984-1994: 15 en décembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6.551, Petite Côte 685, Dakar 25.

*Gambie* = commun hivernant européen entre la fin d'août et le début de mai.

## STERNIDAE

### **153. Sterne hansel**

Gull-billed Tern, Sterna zampe nere - *Gelochelidon nilotica* \*

[syn. *Sterna nilotica*]

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et nicheur (en mai-juillet) dans le Delta du Sénégal, et commun hivernant européen, surtout entre septembre et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 12 (5% du total) et Delta du Sénégal 205 en 2002; Djoudj 2 (0,05% du total), Lac de Guier 8 et Delta du Sénégal 4.138 en 2003; Djoudj 2 (2% du total) et Delta du Sénégal 111 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical et migrateur européen

commun (n. max. 1984-1994: 392 en janvier 1990).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 612, Petite Côte 16, Dakar 0.

*Gambie* = visiteur peu nombreux en hiver, présent surtout entre septembre et avril.

#### **154. Sterne caspienne**

Caspian Tern, *Sterna maggiore* - *Sterna caspia* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et nicheur, et hivernant européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)*  
= Djoudj 69 (13% du total) et Delta du Sénégal 444 en 2002; Djoudj 28 (6% du total), Lac de Guier 43 et Delta du Sénégal 363 en 2003; Djoudj 54 (6% du total), Lac de Guier 2 et Delta du Sénégal 793 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = nicheur afrotropical et migrateur européen commun (n. max. 1984-1994: env. 270 en février 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2.208, Petite Côte 239, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur (env. 150 couples en août 1989).

#### **155. Sterne royale**

Royal Tern, *Sterna reale* - *Sterna maxima* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain, commun près de la côte.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)*  
= Djoudj 0 et Delta du Sénégal 15 en 2002; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 154 en 2003; Djoudj 0 et Delta du Sénégal 263 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1.133, Petite Côte 28, Dakar 0.

*Gambie* = résident et probablement nicheur.

#### **156. Sterne caugek**

Sandwich Tern, Beccapesci - *Sterna sandvicensis* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen commun surtout près de la côte.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 14 (56% du total) et Delta du Sénégal 11 en 2002; Djoudj 4 (9% du total), Lac de Guier 8 et Delta du Sénégal 30 en 2003; Djoudj 5 (2% du total) et Delta du Sénégal 200 en 2004.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun, présent

surtout entre octobre et mars (n. max. 1984-1994: 20 en janvier 1994).  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.  
*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4.050,  
Petite Côte 218, Dakar 10.  
*Gambie* = migrateur et hivernant européen commun entre septembre et mai (n.  
max. env 50), plus fréquent entre novembre et mars et présent en été  
aussi, mais peu nombreux.

### **157. Sterne pierregarin**




Common Tern, Sterna comune – *Sterna hirundo* \*\*  
*Sénégal septentrional* = commun résident, migrateur intra-africain et hivernant  
européen près de la côte.  
*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002 et 2003)* = Djoudj  
0 et Delta du Sénégal 25 en 2002; Djoudj 0 et Lac de Guier 8 en 2003.  
*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen peu nombreux.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = octobre-novembre et février.  
*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 145,  
Petite Côte 14, Dakar 0.  
*Gambie* = rare migrateur européen, présent près de la côte entre novembre et  
juillet.

### **158. Sterne naine**

Little Tern, Fraticello – *Sterna albifrons* \*\*  
*Sénégal septentrional* = fréquent résident et migrateur intra-africain, et nicheur  
près de la côte en avril-mai.  
*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)*  
= Djoudj 6 (16% du total) et Delta du Sénégal 31 en 2002; Djoudj 1 (2%  
du total), Lac de Guier 33 et Delta du Sénégal 9 en 2003; Djoudj 0, Lac  
de Guier 20 et Delta du Sénégal 12 en 2004.  
*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical nicheur (env. 20 couples en  
juillet 1979) et migrateur européen pas commun en octobre-novembre et  
mars-avril, et rare entre décembre et février.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.  
*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 389,  
Petite Côte 16, Dakar 0.  
*Gambie* = migrateur européen présent en septembre-novembre et mars-mai (n.  
max. env. 100 en mai 1975), plus nombreux entre novembre et avril, et  
rare nicheur.

### **159. Guifette moustac**

Whiskered Tern, Mignattino piombato - *Chlidonias hybridus* \*\*  
*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur (en août-octobre et avril) et hivernant



**Guifette moustac (159)**

Whiskered Tern, Mignattino piombato - *Chlidonias hybridus*

**Guifette noire (160)**

Black Tern, Mignattino - *Chlidonias niger*

**Guifette leucoptère (161)**

White-winged Tern, Mignattino alibianche - *Chlidonias leucopterus*

européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 3 (20% du total) et Delta du Sénégal 12 en 2002; Djoudj 27 (34% du total), Lac de Guier 1 et Delta du Sénégal 51 en 2003; Djoudj 12 (100% du total de le Delta du Sénégal) en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen plus commun entre septembre et avril (n. max. 1984-1994: 392 en février 1992), et peu nombreux jusqu'à la moitié de novembre.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 21, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen peu nombreux (n. max. env. 30 en janvier 1979).

### **160. Guifette noire**

Black Tern, Mignattino - *Chlidonias niger* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur (en septembre-octobre et mars-mai), plus nombreux à la fin de la saison des pluies, et hivernant européen.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002, 2003 et 2004)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 20 en 2002; pas observé en 2003; Djoudj 1 (50% du total) et Delta du Sénégal 1 en 2004.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen plus fréquent entre septembre et avril, et surtout jusqu'à la moitié de novembre (n. max. 1984-1994: 254 en novembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 0, Dakar 3.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen très commun entre juillet et mai, et surtout en août-octobre et mars, est présent pendant l'été aussi, avec 100-160 exemplaires.

### **161. Guifette leucoptère**


White-winged Tern, Mignattino alibianche – *Chlidonias leucopterus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur européen, présent entre la fin de juillet et avril.

*Parc du Djoudj, Delta du Sénégal et Lac de Guier (janvier 2002 et 2003)* = Djoudj 0 et Delta du Sénégal 52 en 2002; pas observé en 2003.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen commun entre septembre et avril, mais surtout en janvier-février (n. max. entre 1984 et 1994: env. 1.200 en février 1993), et peu nombreux jusqu'à décembre.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.



**Ganga à ventre brun (162)**

Chestnut-bellied Sandgrouse, Granddule ventre castano - *Pterocles exustus*

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 5, Petite Côte 52, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen nombreux surtout en mars-avril.

## PTEROCLIDAE

### 162. Ganga à ventre brun

Chestnut-bellied Sandgrouse, Grandule ventre castano - *Pterocles exustus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur, surtout en avril-juin.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun afrotropical nicheur (n. max. 1984-1994: env. 100).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 3, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare migrateur.

## COLUMBIDAE

### 163. Tourtelette d'Abyssinie

Black-billed Wood Dove, Tortora abissina - *Turtur abyssinicus*

*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur, à la fin et après les pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = décembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 40, Petite Côte 3, Dakar 1.

*Gambie* = commun résident.

### 164. Tourtelette à masque de fer

Namaqua Dove, Tortora maschera di ferro - *Oena capensis* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984- 1994: 18 en décembre 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 164, Petite Côte 48, Dakar 0.

*Gambie* = commun migrateur pendant la saison sèche (entre la fin d'octobre et juin), plus nombreux en décembre-janvier et exceptionnellement nicheur.

### 165. Pigeon de Guinée

Speckled Pigeon, Colomba di Guinea - *Columba guinea* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 33 en décembre 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 79, Petite Côte 45, Dakar 6.

*Gambie* = commun résident et nicheur, présent surtout entre novembre et mars et moins nombreux pendant les pluies.

### 166. Tourterelle pleureuse

Mourning Dove, *Tortora lamentosa africana* - *Streptopelia decipiens* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical entre octobre et avril (n. max. 1984-1994: env. 100 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 15, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, présent entre novembre et janvier.

### 167. Tourterelle vineuse

Vinaceous Dove, *Tortora vinacea* - *Streptopelia vinacea* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 4), présent surtout entre novembre et mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 59, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident et nicheur très commun.

### 168. Tourterelle rieuse

African Collared Dove, *Tortora dal collare africana* - *Streptopelia roseogrisea*

\*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et partial migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 15 en janvier 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = résident peu nombreux (n. max. groupes de 25-100 au début des pluies et de la saison sèche).

### 169. Tourterelle des bois

European Turtle Dove, *Tortora comune* - *Streptopelia turtur*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur et fréquent hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux en

novembre-avril (n. max. 1984-1994: 18 en mars 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 223, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen très commun mais irrégulier, présent entre février et mars (n. max. plus que 1.000.000 en février 1976).

### **170. Tourterelle maillée**

Laughing Dove, Tortora del Senegal - *Streptopelia senegalensis* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 20 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = nombreux dans tout le territoire.

*Gambie* = commun résident et nicheur.

## PSITTACIDAE

### **171. Perruche à collier**

Rose-ringed Parakeet, Parrocchetto dal collare – *Psittacula krameri* \*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical peu nombreux (n. max. 1984-1994: 8).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = novembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = signalé dans tout le territoire.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre décembre et mai.

## CUCULIDAE

### **172. Coucou geai**


Great Spotted Cuckoo, Cuculo dal ciuffo – *Clamator glandarius*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun, migrateur intra-africain, nicheur (en avril-août dans les nids de Corbeau pie, *Corvus albus*) et hivernant européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical et migrateur européen pas commun, présent surtout entre septembre et janvier (n. max. 1984-1994: 4).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et janvier.

*Gambie* = peu nombreux (en particulier entre novembre et mars) résident et hivernant européen.



**Tourterelle des bois (169)**

European Turtle Dove, Tortora comune – *Streptopelia turtur*

**Coucou gris (173)**

Common Cuckoo, Cuculo – *Cuculus canorus*

**Coucou geai (172)**

Great Spotted Cuckoo, Cuculo dal ciuffo – *Clamator glandarius*

### 173. Coucou gris

Common Cuckoo, Cuculo – *Cuculus canorus*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = rare migrateur européen.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = novembre.

*Gambie* = migrateur intra-africain et nicheur, et hivernant européen, est présent toute l'année, sauf janvier et février.

### 174. Coucou de Klaas

Yellow-billed Cuckoo, Cuculo dorato di Klaas - *Chrysococcyx klaas*

*Sénégal septentrional* = en general fréquent nicheur et migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = novembre.

*Gambie* = migrateur intra-africain fréquent pendant la saison sèche, et surtout entre octobre et février.

### 175. Coucou didric

Didric Cuckoo, Cuculo dorato di Levaillant - *Chrysococcyx caprius* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur intra-africain et nicheur.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux.

*Gambie* = nicheur fréquent entre juin et novembre.

### 176. Coucal du Sénégal

Senegal Coucal, Cuculo fagiano del Senegal - *Centropus senegalensis* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 2) et absent pendant quelques années.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 25, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre juillet et novembre.

## TYTONIDAE

### 177. Effraie des clochers



Barn Owl, Barbagianni – *Tyto alba* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre septembre et mars.

*Gambie* = résident et nicheur entre décembre et mars.



**Coucou didric (175)**

Didric Cuckoo, Cuculo dorato di Levaillant - *Chrysococcyx caprius*

**Coucal du Sénégal (176)**

Senegal Coucal, Cuculo fagiano del Senegal - *Centropus senegalensis*

## STRIGIDAE

### 178. Petit-duc scops

European Scops Owl, Assiolo - *Otus scops*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen peu nombreux, présent entre septembre et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = rare migrateur européen (n. max. 1984-1994: 7 dans un dortoir-reposoir), présent surtout en octobre-mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = possible confusion avec le Petit-duc africain, *Otus senegalensis*.

### 179. Petit-duc africain

African Scops Owl, Assiolo africano - *Otus senegalensis*

*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur en septembre.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun.

*Gambie* = résident probablement fréquent, rare nicheur à la fin de la saison des pluies.

### 180. Petit-duc à face blanche

White-faced Owl, Assiolo faccia bianca - *Ptilopsis leucotis*

[syn. *Otus leucotis*]

*Sénégal septentrional* = résident fréquent et nicheur en février-avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 5 en mars 1990).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février et mars.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur, entre octobre et janvier.

### 181. Grand-duc de Verreaux

Verreaux's Eagle Owl, Gufo latteo - *Bubo lacteus*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux et nicheur pendant la saison sèche.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = résident pas commun et nicheur, entre décembre et février.

### 182. Hibou des marais


Short-eared Owl, Gufo di palude - *Asio flammeus*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun (n. max. 1984-1994: 10 en décembre 1991).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Gambie* = présent à partir de 1990.



**Perruche à collier (171)**

Rose-ringed Parakeet, Parrocchetto dal collare – *Psittacula krameri*

### 183. Hibou du Cap

African Marsh Owl, Gufo di palude africano - *Asio capensis*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux et partial migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et janvier.

*Gambie* = migrateur intra-africain peu nombreux et irrégulier, présent pendant la saison sèche et surtout en août-septembre (n. max. env. 80 dans un dortoir-reposoir).

## CAPRIMULGIDAE

### 184. Engoulevent à longue queue

Long-tailed Nightjar, Succiacapre coda lunga - *Caprimulgus climacurus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et migrateur intra-africain, présent entre mars et septembre et surtout en mai-juillet.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 25 dans un dortoir-reposoir).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = probablement présent toute l'année.

### 185. Engoulevent doré

Golden Nightjar, Succiacapre dorato - *Caprimulgus eximius*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical très rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et novembre.

*Gambie* = pas présent.

### 186. Engoulevent du désert

Egyptian Nightjar, Succiacapre isabellino - *Caprimulgus aegyptius*

*Sénégal septentrional* = hivernant éurasiatique pas commun, présent entre octobre et avril, et migrateur trans-saharien présent entre décembre et février.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur éurasiatique rare.


*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = pas observé.

### 187. Engoulevent à collier roux

Red-necked Nightjar, Succiacapre collo rosso - *Caprimulgus ruficollis*

*Sénégal septentrional* = hivernant éurasiatique peu nombreux, présent en octobre-mars.



**Effraie des clochers (177)**

Barn Owl, Barbagianni – *Tyto alba*

**Petit-duc scops (178)**

European Scops Owl, Assiolo - *Otus scops*

**Hibou des marais (182)**

Short-eared Owl, Gufo di palude – *Asio flammeus*

**Martinet noir (191)**

Common Swift, Rondone – *Apus apus*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur éurasiatique rare.  
*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.  
*Gambie* = très rare, la première observation en novembre 1990.

### 188. Engoulevent à balanciers

Standard-winged Nightjar, Succiacapre dal bilanciare - *Macrodipteryx longipennis*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur intra-africain et nicheur, en mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Gambie* = résident, fréquent surtout en novembre-février et, moins nombreux, en juin-septembre, et nicheur en juin-juillet.

## APODIDAE

### 189. Martinet des palmiers

African Palm Swift, Rondone delle palme – *Cypsiurus parvus* \*

*Sénégal septentrional* = commun résident, plus fréquent pendant les pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 285,  
Petite Côte 20, Dakar 5.

*Gambie* = commun résident et nicheur, en juin-octobre.

### 190. Martinet pâle

Pallid Swift, Rondone pallido – *Apus pallidus*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, présent en septembre-octobre et entre février et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier-février et avril.

*Gambie* = rare migrateur (en juillet-septembre et en novembre-janvier) et hivernant européen, plus nombreux en décembre-janvier (n. max. env. 20 en février 1966).

### 191. Martinet noir

Common Swift, Rondone – *Apus apus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun (n. max. 1984-1994: env. 50 en août 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et avril et en août.

*Gambie* = commun migrateur européen entre la fin de juin et novembre, plus fréquent en août-septembre, et moins en mars-avril.

### 192. Martinet des maisons

Little Swift, Rondone indiano - *Apus affinis* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun, présent surtout en avril (n. max. 1984-1994: 8 en avril 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 543, Petite Côte 66, Dakar 20.

*Gambie* = résident et nicheur (en janvier-février et juillet-août) très commun entre juillet et novembre, et moins nombreux en avril-mai.

## COLIIDAE

### 193. Coliou à nuque bleue

Blue-naped Mousebird, Uccello topo nuca blu - *Urocolius macrourus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun (n. max. 1984-1994: env. 50 en mars 1989) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 27, Petite Côte 0, Dakar 11.

*Gambie* = migrateur intra-africain très rare.

## ALCEDINIDAE

### 194. Martin-chasseur à tête grise

Grey-headed Kingfisher, Martin pescatore testa grigia - *Halcyon leucocephala*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident, nicheur entre juin et août et migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 5 en 1991-1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = décembre et janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 0, Dakar 1.

*Gambie* = résident fréquent (plus nombreux en juin-juillet et janvier) et nicheur, en avril-juin.

### 195. Martin-chasseur du Sénégal

Senegal Kingfisher, Martin pescatore di bosco - *Halcyon senegalensis*

*Sénégal septentrional* = migrateur intra-africain et nicheur pendant la saison des pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 6).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre juillet et décembre.

*Gambie* = commun migrateur intra-africain entre la deuxième moitié de juin et la fin de novembre, et nicheur en août-novembre.

#### **196. Martin-chasseur strié**

Striped Kingfisher, Martin pescatore striato - *Halcyon chelicuti*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux et nicheur au début d'octobre.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février et mars.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur, en juin-juillet.

#### **197. Martin-pêcheur huppé**

Malachite Kingfisher, Martin pescatore malachite - *Alcedo cristata* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur, localisé.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical fréquent.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6, Petite Côte 1, Dakar 0.

*Gambie* = résident fréquent, plus nombreux pendant la saison des pluies, entre juillet et novembre, et nicheur en septembre-octobre.

#### **198. Martin-pêcheur azuré**

Shining Blue Kingfisher, Martin pescatore splendente - *Alcedo quadibrachys*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = octobre.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain, présent surtout pendant la saison des pluies, entre le début de juillet et la fin de septembre.

#### **199. Martin-pêcheur pie**

Pied Kingfisher, Martin pescatore bianco e nero - *Ceryle rudis* \*\*

*Sénégal septentrional* = surtout sédentaire.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 72 en décembre 1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 217, Petite Côte 7, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, en décembre-février.

## MEROPIDAE

### 200. Guêpier nain

Little Bee-eater, Gruccione petto canella minore - *Merops pusillus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 11 en janvier 1991).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 44, Petite Côte 10, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, en mai-juillet.

### 201. Guêpier à gorge blanche

White-throated Bee-eater, Gruccione gola bianca - *Merops albicollis*

*Sénégal septentrional* = commun nicheur dans la période des pluies (mai-octobre) et migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical nicheur commun entre septembre et décembre (n. max. 1984-1994: env. 30 en octobre 1991), et quelques fois jusqu'à janvier-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et janvier, et en mars-avril.

*Gambie* = migrateur intra-africain irrégulier, présent surtout entre novembre et mai.

### 202. Guêpier d'orient

Little Green Bee-eater, Gruccione verde piccolo - *Merops orientalis* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident, nicheur en avril-juin et migrateur partial.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 6, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare nicheur et visiteur dans la saison sèche.

### 203. Guêpier de Perse

Blue-checked Bee-eater, Gruccione guance blu - *Merops persicus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur éurasiatique et intra-africain fréquent, entre mai et octobre, et nicheur en juin-juillet.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical (21 nids en octobre 1986), commun surtout en mars-novembre (n. max. 1984-1994: env. 1.000 en novembre 1987), et rare entre la fin de novembre et la moitié de mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur présent toute l'année, sauf en février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 373, Petite Côte 1, Dakar 0.

*Gambie* = commun migrateur, présent surtout entre octobre et avril (n. max. 50-100 en mars).

#### **204. Guêpier d'Europe**

European Bee-eater, Gruccione – *Merops apiaster* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas commun, présent entre septembre et mai.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun entre août et avril (n. max. 1984-1994: env. 40 en octobre 1991, mais rarement avec plus que 10 exemplaires), et peu nombreux en novembre-février.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 19, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen pas commun en octobre-novembre et janvier-mars, en groupes de 15-30.

#### **205. Guêpier écarlatte**

Northern Carmine Bee-eater, Gruccione carminio - *Merops nubicus*

*Sénégal septentrional* = nicheur localement fréquent.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = commun migrateur, plus nombreux entre août et le début de la saison sèche

### CORACIIDAE

#### **206. Rollier d'Abyssinie**

Abyssinian Roller, Ghiandaia marina abissina - *Coracias abyssinica* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur intra-africain et nicheur entre avril et juillet.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 6).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.


*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 90, Petite Côte 8, Dakar 0.

*Gambie* = commun migrateur pendant la saison sèche (entre novembre et juin) et nicheur.

#### **207. Rollier d'Europe**

European Roller, Ghiandaia marina – *Coracias garrulus*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun et hivernant peu



**Coliou à nuque bleue (193)**

Blue-naped Mousebird, Uccello topo nuca blu - *Urocolius macrourus*

**Guêpier scarlatte (205)**

Northern Carmine Bee-eater, Gruccione carminio - *Merops nubicus*

nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre février et avril, en août et en octobre.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen peu nombreux.

## PHOENICULIDAE

### 208. Irrisor moqueur

Green Wood-hoopoe, *Upupa arborea purpurea* - *Phoeniculus purpureus*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = novembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 46,

Petite Côte 3, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre juin et novembre.

## UPUPIDAE

### 209. Huppe fasciée

Hoopoe, *Upupa* – *Upupa epops* \*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur et hivernant européen, et résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical et migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: 6).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 31,

Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident pas nombreux et nicheur en mars-avril, et migrateur européen fréquent, surtout en décembre-mars.

## BUCEROTIDAE

### 210. Petit calao à bec rouge

Red-billed Hornbill, *Bucero becco rosso* - *Tockus erythrorhynchus* \*\*


*Sénégal septentrional* = commun résident et nicheur.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 6).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = commun partout.

*Gambie* = commun résident et nicheur.



**Petit calao à bec rouge (210)**

Red-billed Hornbill, Bucero becco rosso - *Tockus erythrorhynchus*

### 211. Petit calao à bec noir

Grey Hornbill, Bucero nasuto - *Tockus nasutus*

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain commun.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 2).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = présent partout.

*Gambie* = résident commun et nicheur, entre novembre et mars.

## LYBIIDAE

### 212. Barbican de Vieillot

Vieillot's Barbet, Barbuto di Vieillot - *Lybius vieilloti*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 8, Petite Côte 0, Dakar 2.

*Gambie* = résident pas commun et nicheur, en mai-juillet.

## INDICATORIDAE

### 213. Grand indicateur

Greater Honeyguide, Indicatore gola nera - *Indicator indicator* \*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = novembre.

*Gambie* = résident et nicheur fréquent.

## PICIDAE

### 214. Torcol fourmilier

Eurasian Wryneck, Torcicollo – *Jynx torquilla*




*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, présent surtout entre octobre et mars.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: 5) en octobre-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 3, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen pas nombreux, présent entre novembre et avril.



**Guêpier d'Europe (204)**

European Bee-eater, Gruccione – *Merops apiaster*

**Rollier d'Europe (207)**

European Roller, Ghiandaia marina – *Coracias garrulus*

**Huppe fasciée (209)**

Hoopoe, Upupa – *Upupa epops*

**Torcol fourmilier (214)**

Eurasian Wryneck, Torcicollo – *Jynx torquilla*

### 215. Pic gris

Grey Woodpecker, Picchio di Goerta - *Dendropicos goertae* \*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et nicheur pendant la deuxième moitié de la saison sèche.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical nicheur (avec au moins 5 couples), fréquent (n. max. 1984-1994: 11 en avril 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 8, Petite Côte 1, Dakar 1.

*Gambie* = résident commun et nicheur, en mars-mai.

## ALAUDIDAE

### 216. Alouette chanteuse

Singing Bush Lark, Allodola canora - *Mirafra cantillans* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement fréquent, nicheur dans les zones arides pendant la saison des pluies.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et février.

*Gambie* = migrateur intra-africain très rare, présent surtout pendant la saison sèche.

### 217. Sirli du désert

Hoopoe Lark, Allodola becco curvo - *Alaemon alaudipes*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur intra-africain, observé à partir de 1970.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre janvier et mars et en novembre.

*Gambie* = pas présent.

### 218. Alouette calandrelle

Short-toed Lark, Calandrella - *Calandrella brachydactyla*

*Sénégal septentrional* = fréquent hivernant européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen commun entre novembre et mars (n. max. 1984-1994: plusieurs centaines en janvier 1993 en dortoirs-reposoirs), rarement moins que 10 avant janvier.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Gambie* = très rare, observé pour la première fois en 1994.

### 219. Cochevis huppé

Crested Lark, Cappellaccia – *Galerida cristata* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et migrateur partial.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = nicheur afrotropical (en janvier-février)

commun (n. max. 1984-1994: 65 en décembre 1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = commun dans toutes les zones sèches.

*Gambie* = résident et nicheur commun entre novembre et mai, et surtout en décembre-février.

## **220. Moinelette à oreillons blancs**

Chestnut-backed Finch-lark, Allodola orecchie bianche - *Eremopterix leucotis*

*Sénégal septentrional* = commun résident et migrateur intra-africain.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = nicheur afrotropical commun (n. max. 1984-1994: env. 50 en février 1992), mais rarement en groupes supérieurs à 20 exemplaires.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 169, Petite Côte 35, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent résident et rare nicheur.

## **221. Moinelette à front blanc**

White-fronted Finch-lark, Allodola capinera - *Eremopterix nigriceps* \*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent, commun localement.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 20 en 1990-1991), a envahi le Sénégal septentrional en 1972.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = pas observé.

# HIRUNDINIDAE

## **222. Hirondelle paludicole**

African Sand Martin, Topino africano - *Riparia paludicola*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain, présent entre novembre et janvier.

## **223. Hirondelle de rivage**

European Sand Martin, Topino – *Riparia riparia* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur et hivernant européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen très commun entre septembre et avril, et en petits groupes jusqu'à la moitié d'octobre, très nombreux entre la fin d'octobre et avril (présence 1984-1994: env. 2.000.000 exemplaires pendant l'hiver), en migration vers le nord à partir

de la moitié de février.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 28, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur commun (en mars, et moins nombreux en septembre-novembre) et hivernant européen.

#### **224. Hirondelle des mosquées**

Mosque Swallow, Rondine del Senegal - *Hirundo senegalensis*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux et migrateur partial intra-africain.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 17, Petite Côte 3, Dakar 0.

*Gambie* = commun nicheur après ou pendant la saison des pluies (entre mai et octobre), et rare pendant les autres mois.

#### **225. Hirondelle rousseline**

Red-rumped Swallow, Rondine rossiccia - *Hirundo daurica*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent, migrateur européen et partial intra-africain, hivernant européen.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen peu nombreux en février-avril (n. max. 1984-1994: 10 en mars 1991 dans un dortoir-reposoir).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre février et avril.

*Gambie* = commun résident et nicheur, en février-mars et quelques fois jusqu'à septembre-octobre.

#### **226. Hirondelle de Guinée**

Red-chested Swallow, Rondine lucente – *Hirundo lucida* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur partial intra-africain, très rare.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = pas reconnu comme espèce différente de l'Hirondelle rustique, *Hirundo rustica*.



*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 206, Petite Côte 8, Dakar 0.

*Gambie* = résident et nicheur très commun, entre février et juillet.

#### **227. Hirondelle rustique**

European Swallow, Rondine – *Hirundo rustica* \*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur et hivernant européen, présent surtout entre août et mai, et rarement pendant l'été.



**Cochevis huppé (219)**

Crested Lark, Cappellaccia – *Galerida cristata*

**Hirondelle de rivage (223)**

European Sand Martin, Topino – *Riparia riparia*

**Hirondelle rousseline (225)**

Red-rumped Swallow, Rondine rossiccia - *Hirundo daurica*

**Hirondelle rustique (227)**

European Swallow, Rondine – *Hirundo rustica*

**Hirondelle de fenêtre (228)**

House Martin, Balestruccio – *Delichon urbica*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen commun entre août et avril, et surtout dans la migration jusqu'à la fin de novembre (n. max. 1984-1994: env. 40 par jour), et en migration vers le nord à partir de la fin de janvier, et plus nombreux en mars-avril (n. max. 1984-1994: env. 300); peu nombreux en décembre-janvier.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Gambie* = commun migrateur européen (n. max. 150-200 en mai 1976).

## **228. Hirondelle de fenêtre**

House Martin, Balestruccio – *Delichon urbica* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, en août-septembre et mars-mai, avec quelques exemplaires pendant l'été.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux en novembre-avril, et surtout en migration (novembre et février-avril). Autrefois pas signalé pendant la migration automnale et avec peu d'exemplaires pendant l'hiver (décembre-février), sauf qu'en 1991-1992.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 39, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur irrégulier (en mars-mai) et hivernant européen pas commun (n. max. env. 250 en décembre 1965) entre octobre et juin.

## MOTACILLIDAE

### **229. Bergeronnette printanière**

Yellow Wagtail, Cutrettola – *Motacilla flava* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur et hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen très commun en octobre-avril (n. max. 1984-1994: env. 250.000 en décembre 1992 en dortoirs-reposoirs).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 118, Petite Côte 0, Dakar 0.




*Gambie* = commun migrateur européen en septembre-novembre et février-avril, avec quelques hivernants.

### **230. Bergeronnette des ruisseaux**

Grey Wagtail, Ballerina gialla - *Motacilla cinerea*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur et hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.



**Bergeronnette printanière (229)**  
Yellow Wagtail, Cutrettola – *Motacilla flava*

**Bergeronnette des ruisseaux (230)**  
Grey Wagtail, Ballerina gialla - *Motacilla cinerea*

**Bergeronnette grise (231)**  
White Wagtail, Ballerina bianca – *Motacilla alba*

*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars.  
*Gambie* = très rare, entre octobre et mars.

### **231. Bergeronnette grise**

White Wagtail, Ballerina bianca – *Motacilla alba* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur et hivernant européen, présent entre septembre et avril.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = commun migrateur européen (n. max. 1984-1994: env. 50 en dortoirs-reposoirs) en octobre-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 22, Petite Côte 7, Dakar 20.

*Gambie* = commun migrateur et hivernant européen présent entre septembre et avril, et plus nombreux en octobre.

### **232. Pipit rousseline**

Tawny Pipit, Calandro - *Anthus campestris* \*\*

*Sénégal septentrional* = visiteur européen d'hiver, pas commun.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = migrateur européen commun en novembre-avril, et plus nombreux en janvier-février (n. max. 1984-1994: env. 100 en février), rarement avec plus que 10 exemplaires pendant les autres mois.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 10, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare hivernant et migrateur européen, présent en décembre-avril.

### **233. Pipit à long bec**

Long-billed Pipit, Pispola becco lungo - *Anthus similis*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical pas commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = pas observé.

### **234. Pipit à dos uni**



Plain-backed Pipit, Calandro dai sopraccigli bianchi - *Anthus leucophrys*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

***Parc National des Oiseaux du Djoudj*** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier-février et avril.

*Gambie* = résident commun et nicheur en avril-juillet.



**Pipit rousseline (232)**

Tawny Pipit, Calandro - *Anthus campestris*

**Pipit des arbres (235)**

Tree Pipit, Prispolone - *Anthus trivialis*

**Pipit à gorge rousse (236)**

Red-throated Pipit, Pispola golarossa - *Anthus cervinus*

### 235. Pipit des arbres

Tree Pipit, Prispolone - *Anthus trivialis* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur et hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril, et surtout en janvier-mars (n. max 1984-1994: env. 50 en mars 1993), mais rarement avec plus que 5 exemplaires.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = migrateur européen pas nombreux en septembre-décembre et mars-mai (n. max. 12 en mars 1966), avec quelques hivernants.

### 236. Pipit à gorge rousse

Red-throated Pipit, Pispola golarossa - *Anthus cervinus*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun en décembre-janvier (n. max. 1984-1994: 5), et rare en février-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et avril.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen peu nombreux mais régulier en novembre-mai, et plus fréquent en avril..

## PYCNONOTIDAE

### 237. Bulbul commun

Garden Bulbul, Bulbul gola nera - *Pycnonotus barbatus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident très commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 2).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = commun dans la plupart de la zone.

*Gambie* = résident et nicheur (entre juin et octobre) très commun

## TURDIDAE

### 238. Rossignol philomèle





Nightingale, Usignolo – *Luscinia megarhynchos*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen et hivernant (entre septembre et avril) pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun, présent surtout pendant les migrations (octobre-novembre et mars-avril).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et janvier, et en mars-avril.

*Gambie* = fréquent migrateur et hivernant européen, présent en novembre-mars et surtout à la fin de novembre.



**Rosignol philomèle (238)**

Nightingale, Usignolo – *Luscinia megarhynchos*

**Gorgebleue (239)**

Bluethroat, Pettazzurro – *Luscinia svecica*

**Rougequeue noir (242)**

Black Redstart, Codirosso spazzacamino – *Phoenicurus ochruros*

**Rougequeue à front blanc (243)**

Redstart, Codirosso – *Phoenicurus phoenicurus*

### 239. Gorgebleue

Bluethroat, Pettazzurro – *Luscinia svecica*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen pas commun, présent entre septembre et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen commun en octobre-avril (n. max. 1984-1994: 10).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare migrateur européen.

### 240. Agrobate roux

Rufous Scrub-robin, Usignolo d’Africa - *Cercotrichas galactotes* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun, plus fréquent entre septembre et avril pour la présence des migrateurs européens.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical et migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: 9).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l’année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain (et peut-être européen aussi).

### 241. Agrobate podobé

Black Scrub-robin, Usignolo podobè - *Cercotrichas podobe*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et nicheur, en février-juillet.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 15 en décembre 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l’année.

*Gambie* = pas présent.

### 242. Rougequeue noir

Black Redstart, Codirosso spazzacamino – *Phoenicurus ochruros*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen d’hiver.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et avril.

*Gambie* = pas observé.

### 243. Rougequeue à front blanc

Redstart, Codirosso – *Phoenicurus phoenicurus* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen fréquent entre septembre et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril, et surtout (n. max 1984-1994: 18) pendant les migrations, en

octobre-novembre et mars-avril, et observé jusqu'à 4 exemplaires pendant l'hiver (décembre-février).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 15, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent migrateur européen (octobre-novembre et février-mars) et hivernant peu nombreux.

#### **244. Traquet des prés**

Whinchat, Stiacchino - *Saxicola rubetra* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen pas commun, présent entre septembre et mai.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen peu nombreux en novembre-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 3, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun migrateur européen en octobre-novembre et février-mars, avec quelques présences pendant l'hiver, entre septembre et avril.

#### **245. Traquet pâtre**

Stonechat, Saltimpalo – *Saxicola torquata* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun et hivernant européen irrégulier.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = afrotropical peu nombreux (n. max. 1984-1994: 16) et probable migrateur européen, présent surtout entre novembre et mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = pas observé.

#### **246. Traquet motteux**

Wheatear, Culbianco – *Oenanthe oenanthe* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen commun, entre septembre et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen commun en octobre-avril (n. max. 1984-1994: 21 en décembre 1988).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 45, Petite Côte 12, Dakar 1.

*Gambie* = migrateur européen fréquent en février-mars, avec hivernants peu nombreux, en réduction numérique pendant les dernières années.

#### **247. Traquet oreillard**

Spanish Wheatear, Monachella - *Oenanthe hispanica* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun entre septembre et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun en octobre-mars (n. max. 1984-994: 5).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = migrateur européen très rare.

#### **248. Traquet du désert**

Desert Wheatear, Monachella del deserto - *Oenanthe deserti*

*Sénégal septentrional* = hivernant éurasiatique peu nombreux, présent entre septembre et avril et surtout en décembre-février.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur éurasiatique peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = très rare.

#### **249. Traquet isabelle**

Isabelline Wheatear, Culbianco isabellino - *Oenanthe isabellina* \*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, entre octobre et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = migrateur européen très rare.

#### **250. Traquet-fourmillier brun**

Ant-chat, Sassicola mangia formiche - *Myrmecocichla aethiops* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 2).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 16, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = présence régulière tout de suite après les pluies.




#### **251. Merle bleu**

Blue Rock-thrush, Passero solitario – *Monticola solitaria*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur et hivernant européen, présent entre octobre et le début d'avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars.



**Traquet des prés (244)**

Whinchat, Stiaccino - *Saxicola rubetra*

**Traquet pâtre (245)**

Stonechat, Saltimpalo - *Saxicola torquata*

**Traquet motteux (246)**

Wheatear, Culbianco - *Oenanthe oenanthe*

**Merle bleu (251)**

Blue Rock-thrush, Passero solitario - *Monticola solitaria*

*Gambie* = rare et irrégulier visiteur d'hiver, présent entre octobre et janvier.

## SYLVIIDAE

### 252. Locustelle lusciniöide

Savi's Warbler, Salciaiola - *Locustella luscinioides* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, présent en octobre-avril et surtout entre décembre et février.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en novembre-avril, mais peu nombreux entre la moitié de décembre et avril (n. max. 1984-1994: 10).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Gambie* = pas observé.

### 253. Locustelle tachetée

Grasshopper Warbler, Forapaglie macchiettato - *Locustella naevia* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen peu nombreux, présent en septembre-avril et surtout entre mars et mai.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en octobre-avril, mais peu nombreux jusqu'à décembre et en avril (n. max. 1984-1994: 13 en décembre 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = rare migrateur européen.

### 254. Phragmite aquatique

Aquatic Warbler, Pagliarolo - *Acrocephalus paludicola*

*Sénégal septentrional* = rare visiteur européen d'hiver, présent entre septembre et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = rare migrateur européen.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et mars.

*Gambie* = pas observé.

### 255. Phragmite des joncs



Sedge Warbler, Forapaglie - *Acrocephalus schoenobaenus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen localement commun, entre septembre et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen très commun en octobre-avril, plus fréquent entre la fin de novembre et la fin de février (n. max. 1984-1994: 109 en janvier 1992), et moins nombreux en avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen régulier (entre novembre et mars) mais pas commun.



**Locustelle lusciniöide (252)**

Savi's Warbler, Salciaiola - *Locustella luscinioides*

**Locustelle tachtée (253)**

Grasshopper Warbler, Forapaglie macchiettato - *Locustella naevia*

**Phragmite aquatique (254)**

Aquatic Warbler, Pagliarolo - *Acrocephalus paludicola*

**Phragmite des joncs (255)**

Sedge Warbler, Forapaglie - *Acrocephalus schoenobaenus*

### **256. Rousserolle verderolle**

Marsh Warbler, Cannaiola verdognola - *Acrocephalus palustris*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur et hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen très rare: un exemplaire dans le Parc en janvier 1994.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = pas observé.

### **257. Rousserolle effarvate**

European Reed Warbler, Cannaiola - *Acrocephalus scirpaceus* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur (en septembre-octobre et mars-mai) et hivernant européen commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen commun en octobre-avril, dans l'hiver en novembre-janvier (n. max. 1984-1994: 39) et surtout dans la migration printanière (n. max. 1984-1994: 378 en mars 1993), à partir de février et surtout en mars-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mai.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen pas commun, présent entre novembre et avril et plus nombreux en janvier.

### **258. Rousserolle turdoïde**

Great Reed Warbler, Cannareccione - *Acrocephalus arundinaceus* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen pas commun, présent entre septembre et mai.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun (n. max. 1984-1994: 7 en décembre 1987).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = rare migrateur européen, observé entre octobre et mai.

### **259. Rousserolle africain**

African Reed Warbler, Cannaiola africana - *Acrocephalus baeticatus* \*

*Sénégal septentrional* = résident localement fréquent et migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 7).



*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = possible résident et nicheur, pendant les premières pluies (en juin-juillet).

### **260. Hypolaïs polyglotte**

Melodious Warbler, Canapino - *Hippolais polyglotta*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen fréquent, présent entre août et avril.



**Rousserolle verderolle (256)**

Marsh Warbler, Cannaiola verdognola - *Acrocephalus palustris*

**Rousserolle effarvatte (257)**

European Reed Warbler, Cannaiola - *Acrocephalus scirpaceus*

**Rousserolle turdoïde (258)**

Great Reed Warbler, Cannareccione - *Acrocephalus arundinaceus*

**Hypolaïs polyglotte (260)**

Melodious Warbler, Canapino - *Hippolais polyglotta*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent dans la migration de l'automne (fin d'août 1987) et moins dans la migration printanière en mars-avril (n. max. 1984-1994: 8 en avril 1992). Une observation pendant l'hiver.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et décembre, et entre février et avril.

*Gambie* = commun migrateur européen entre septembre et mars, et plus nombreux en octobre et février-mars, avec quelques hivernants.

### **261. Hypolaïs pâle**

Olivaceous Warbler, Canapino pallido - *Hippolais pallida* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur et hivernant européen et nordafricain, présent entre la fin d'août et mai.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun migrateur européen et nordafricain (n. max. 1984-1994: env. 60 en mars 1992), plus nombreux entre septembre et avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 20, Petite Côte 4, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent migrateur et hivernant, présent en juillet-mai et surtout en octobre et février-mai pendant les migrations, et plus nombreux en janvier.

### **262. Cisticole roussâtre**

Winding Cisticola, Beccamoschino dorso nero - *Cisticola galactotes*

*Sénégal septentrional* = résident localement fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical (n. max 1984-1994: 9 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = commun résident et nicheur, présent en mai-juin.

### **263. Cisticole striée**

Croaking Cisticola, Beccamoschino del Natal - *Cisticola natalensis*

*Sénégal septentrional* = rare résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 2, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident peu nombreux et nicheur, en août-octobre.

### **264. Cisticole des joncs**

Zitting Cisticola, Beccamoschino - *Cisticola juncidis* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 36 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 5, Petite Côte 2, Dakar 2.

*Gambie* = commun résident et nicheur, entre juillet et octobre.

### **265. Cisticole du désert**

Desert Cisticola, Beccamoschino del deserto - *Cisticola aridulus*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = résident et nicheur, entre juillet et octobre.

### **266. Prinia aquatique**

River Prinia, Prinia del lago Ciad - *Prinia fluviatilis*

*Sénégal septentrional* = probable résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 23 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = pas observé mais probablement présent.

### **267. Prinia à front écaillé**

Cricket Warbler, Beccamoschino vocifero - *Spiloptila clamans*

*Sénégal septentrional* = surtout résident, localement fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun, mais fréquent en 1991-1992, présent en décembre-mars (n. max. 1984-1994: 15 en janvier 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et mars.

*Gambie* = pas présent.

### **268. Camaroptère à tête grise**

Grey-backed Camaroptera, Camarottera dorso grigio - *Camaroptera brachyura* [syn. *Camaroptera brevicaudata*]

*Sénégal septentrional* = résident et nicheur très commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 6).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = commun résident et nicheur, présent entre juin et novembre.

### **269. Erémomèle à croupion jaune**

Grey-backed Eremomela, Eremomela ventre giallo - *Eremomela icteropygialis*  
*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = mars.

*Gambie* = pas présent.

### **270. Erémomèle à dos vert**

Senegal Eremomela, Eremomela piccola - *Eremomela pusilla*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = commun résident (plus nombreux entre avril et août) et nicheur, en février-août.

### **271. Crombec**

Northern Crombec, Silvieta settentrionale - *Sylvieta brachyura*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 5).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 0, Dakar 2.

*Gambie* = résident et nicheur (surtout en juin-juillet), localement commun.

### **272. Fauvette épervière**

Barred Warbler, Bigia padovana - *Sylvia nisoria*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur européen, présent en février-avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février et avril.

*Gambie* = rare migrateur européen, observé en février.

### **273. Fauvette orphée**





Orphean Warbler, Bigia grossa – *Sylvia hortensis*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen pas commun, présent entre septembre et mai, et migrateur (septembre-octobre et mars-mai).

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent (n. max. 1984-1994: 16 en mars 1993) en octobre-avril, moins nombreux jusqu'à la moitié de février.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = rare migrateur européen, plus nombreux entre novembre et mars.



**Cisticole des joncs (265)**

Zitting Cisticola, Beccamoschino – *Cisticola juncidis*

**Fauvette épervière (272)**

Barred Warbler, Bigia padovana - *Sylvia nisoria*

**Fauvette orphée (273)**

Orphean Warbler, Bigia grossa – *Sylvia hortensis*

**Fauvette des jardins (274)**

Garden Warbler, Beccafico - *Sylvia borin*

**Fauvette à tête noire (275)**

Blackcap, Capinera – *Sylvia atricapilla*

### 274. Fauvette des jardins

Garden Warbler, Beccafico - *Sylvia borin*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur, présent en octobre-novembre et en avril-mai, et rare hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent en septembre-mai, et moins nombreux en migration à la fin de novembre et en avril (n. max. 1984-1994: 21 en avril 1993), et peu nombreux entre décembre et mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et mai.

*Gambie* = migrateur européen fréquent entre septembre et avril, et surtout en novembre, avec de rares hivernants.

### 275. Fauvette à tête noire

Blackcap, Capinera – *Sylvia atricapilla*

*Sénégal septentrional* = normalement peu nombreux mais localement commun, migrateur et hivernant européen, présent entre octobre et mai.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun en octobre-mai (n. max. 1984-1994: 33 en novembre 1992), et faiblement plus fréquent pendant les migrations, en novembre-décembre et mars-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mai.

*Gambie* = migrateur et hivernant européen, plus fréquent pendant les hivers plus froids en Europe, entre octobre et mai.

### 276. Fauvette grisette

Common Whitethroat, Sterpazzola – *Sylvia communis* \*\*

*Sénégal septentrional* = hivernant et migrateur européen pas commun, présent entre août et mars.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen commun en octobre-avril, mais pas commun jusqu'à décembre et plus fréquent en février-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1, Petite Côte 0, Dakar 1.





*Gambie* = migrateur et hivernant européen peu nombreux, présent entre novembre et mars.

### 277. Fauvette babillard

Lesser Whitethroat, Bigiarella - *Sylvia curruca*

*Sénégal septentrional* = rare hivernant européen, présent entre septembre et avril.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun (n.



**Fauvette grisette (276)**

Common Whitethroat, Sterpazzola – *Sylvia communis*

**Fauvette babillard (277)**

Lesser Whitethroat, Bigiarella - *Sylvia curruca*

**Fauvette mélanocéphale (278)**

Sardinian Warbler, Occhiocotto - *Sylvia melanocephala*

**Fauvette passerinette (279)**

Subalpine Warbler, Sterpazzolina - *Sylvia cantillans*

max. 1984-1994: 22 en 1992-1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et mars.

*Gambie* = très rare hivernant européen.

### **278. Fauvette mélanocéphale**

Sardinian Warbler, Occhiocotto - *Sylvia melanocephala*

*Sénégal septentrional* = hivernant européen pas commun, présent entre septembre et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en novembre-mars (n. max. 1984-1994: 14 en février 1993), peu nombreux dans la plupart des années.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.

*Gambie* = pas observé.

### **279. Fauvette passerinette**

Subalpine Warbler, Sterpazzolina - *Sylvia cantillans* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun hivernant européen, présent entre août et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen très commun en septembre-avril (n. max. 1984-1994: 104 en décembre 1992), plus fréquent entre décembre et la moitié de février et peu nombreux en avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre septembre et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 13, Petite Côte 0, Dakar 1.

*Gambie* = visiteur européen pendant l'hiver (entre septembre et avril et surtout en janvier-février), peu nombreux mais régulier.

### **280. Fauvette à lunettes**

Spectacled Warbler, Sterpazzola di Sardegna - *Sylvia conspicillata* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun hivernant européen, présent entre août et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en novembre-mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et mars.




*Gambie* = très rare entre décembre et avril.

### **281. Pouillot fitis**

Willow Warbler, Lui grosso - *Phylloscopus trochilus*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur et hivernant européen, présent entre août et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen fréquent en septembre-avril (n. max. 1984-1994: 9 en avril 1993), peu nombreux dans les migrations en octobre-novembre et mars-avril, et présent surtout en décembre-février.



**Pouillot fitis (281)**

Willow Warbler, Lui grosso - *Phylloscopus trochilus*

**Pouillot véloce (282)**

Chiffchaff, Lui piccolo - *Phylloscopus collybita*

**Pouillot de Bonelli (283)**

Bonelli's Warbler, Lui bianco - *Phylloscopus bonelli*

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre septembre et avril.

*Gambie* = commun migrateur européen, présent en octobre-novembre et en mars-avril.

### **282. Pouillot véloce**

Chiffchaff, Lui piccolo – *Phylloscopus collybita* \*\*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen, commun entre septembre et mai.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen très commun (n. max. 1984-1994: 445 en janvier 1992) en octobre-avril et plus fréquent entre novembre et la moitié de février.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum env. 10, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun migrateur européen et hivernant (entre septembre et mai), plus fréquent en décembre-février.

### **283. Pouillot de Bonelli**

Bonelli's Warbler, Lui bianco - *Phylloscopus bonelli*

*Sénégal septentrional* = migrateur et hivernant européen, localement commun entre août et avril.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun en novembre-avril (n. max. 1984-1994: 3 en hiver, et 5 pendant la migration printanière, en mars-avril).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre novembre et avril.

*Gambie* = migrateur européen peu nombreux, présent surtout entre novembre et mars.

## MUSCICAPIDAE

### **284. Gobemouche gris**

Spotted Flycatcher, Pigliamosche – *Muscicapa striata*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen pas commun et rare hivernant, présent entre septembre et mai.

*Parc National des Oiseaux du Djoudj* = migrateur européen pas commun, pendant la migration de l'automne (n. max. 1984-1994: 3) en octobre-décembre et moins dans la migration printanière (en avril); quelques observations pendant l'hiver.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et décembre, en février et en avril.

*Gambie* = fréquent migrateur (en septembre-novembre et moins nombreux en février-mai) et hivernant européen peu nombreux.

### 285. Gobemouche noir

Pied Flycatcher, Balia nera – *Ficedula hypoleuca*

*Sénégal septentrional* = fréquent migrateur européen et rare hivernant, présent entre août et mai.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen fréquent, surtout dans l'automne (septembre – fin d'octobre) (n. max. 1984-1994: plus que 100 en octobre 1991) et moins en printemps (avril).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et octobre, et en avril.

*Gambie* = fréquent migrateur (plus nombreux en septembre-octobre), et hivernant européen très rare.

### 286. Gobemouche nain

Red-breasted Flycatcher, Pigliamosche pettirosso - *Ficedula parva*

*Sénégal septentrional* = rarement présent pendant l'hiver.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = rare migrateur éurasiatique.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = novembre.

*Gambie* = pas observé.

## PLATYSTEIRIDAE

### 287. Batis du Sénégal

Senegal Batis, Pigliamosche del Senegal - *Batis senegalensis*

*Sénégal septentrional* = résident commun et nicheur, entre mai et juillet.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical fréquent.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 1, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident et nicheur (en mai-juillet), pas commun.

## NECTARINIDAE

### 288. Souimanga à poitrine rouge

Scarlet-breasted Sunbird, Nectarinia pettirossa - *Chalcomitra senegalensis*

[syn. *Nectarinia senegalensis*]

*Sénégal septentrional* = résident fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent en février et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4, Petite Côte 2, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent résident et nicheur, en avril-juillet.

### 289. Souimanga pygmée

Pygmy Sunbird, *Nettarinia pigmea* – *Hedydipna platura*

[syn. *Anthreptes platura*]

*Sénégal septentrional* = résident et migrateur intra-africain, et nicheur pendant la saison sèche.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 5, Petite Côte 0, Dakar 1.

*Gambie* = résident pas commun, plus nombreux entre novembre et avril, et nicheur en décembre-mars.

### 290. Souimanga à longue queue

Beautiful Sunbird, *Nettarinia multicolore* - *Cinnyris pulchellus*

[syn. *Nectarinia pulchella*]

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et migrateur intra-africain, vers le nord avec les pluies, et vers le sud pendant la saison sèche.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical fréquent en septembre-avril (n. max. 1984-1994: 6), et moins nombreux en décembre-février.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 61, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident et nicheur, après les pluies (en novembre-mars)

## LANIIDAE

### 291. Pie-grièche isabelle

Isabelline Shrike, *Averla isabellina* - *Lanius isabellinus*

*Sénégal septentrional* = migrateur éurasiatique pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur éurasiatique pas commun en décembre-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et avril.

*Gambie* = très rare.

### 292. Pie-grièche méridionale

Southern Grey Shrike, *Averla maggiore meridionale* - *Lanius meridionalis* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent et rare migrateur intra-africain pendant la saison sèche.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 7).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre octobre et avril.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain.

### **293. Pie-grièche à tête rousse**

Woodchat Shrike, *Averla capirossa* – *Lanius senator* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun migrateur européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen commun en septembre-avril (n. max. 1984-1994: env. 30 en décembre 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre août et avril.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = commun dans toute la zone.

*Gambie* = commun migrateur européen en novembre et février-mars, avec quelques présences pendant l'hiver.

## MALACONOTIDAE

### **294. Brubru africain**

Brubru Shrike, Brubru - *Nilaus afer* \*

*Sénégal septentrional* = résident pas commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre décembre et février.

*Gambie* = probable résident, peu nombreux mais plus fréquent pendant la saison des pluies (juillet-novembre), et rare nicheur.

## ORIOLIDAE

### **295. Lorient d'Europe**

European Golden Oriole, Rigogolo – *Oriolus oriolus*

*Sénégal septentrional* = migrateur européen et hivernant pas commun, présent en septembre-mai et juin.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen pas commun, présent surtout pendant la migration printanière, en avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = avril et octobre.

*Gambie* = rare visiteur européen pendant l'hiver.

## CORVIDAE

### **296. Corbeau brun**

Brown-necked Crow, Corvo collo bruno - *Corvus ruficollis*

*Sénégal septentrional* = résident pas nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier.

*Gambie* = rare migrateur intra-africain, observé entre janvier et mai.

### **297. Corbeau pie**

Pied Crow, Corvo bianco e nero - *Corvus albus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 4).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 52, Petite Côte, Dakar 35.

*Gambie* = commun résident et nicheur, en avril-août.

## STURNIDAE

### **298. Merle métallique à oreillons bleus**

Blue-eared Glossy Starling, Storno orecchie blu maggiore –

*Lamprotornis chalybaeus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident et partial migrateur intra-africain, vers le nord pendant les pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical commun (n. max. 1984-1994: jusqu'à 100).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = commun résident et nicheur, au début des pluies.

### **299. Merle métallique à longue queue**

Long-tailed Glossy Starling, Storno splendente coda lunga - *Lamprotornis caudatus* \*\*

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et partial migrateur intra-africain, vers le nord pendant les pluies.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 30 en janvier 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 328, Petite Côte 42, Dakar env. 12.


*Gambie* = commun résident et nicheur, en septembre-novembre.

### **300. Merle métallique à ventre roux**

Chestnut-bellied Starling, Storno ventre castano - *Lamprotornis pulcher* \*

[syn. *Spreo pulcher*]

*Sénégal septentrional* = fréquent résident et partial migrateur intra-africain, vers le nord pendant les pluies.



**Corbeau pie (297)**

Pied Crow, Corvo bianco e nero – *Corvus albus*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 14 en novembre 1991).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 81, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident a partir de la moitié de 1960, et nicheur.

## BUPHAGIDAE

### 301. Piquebœuf à bec jaune

Yellow-billed Oxpecker, *Buphagus becco giallo* - *Buphagus africanus* \*

*Sénégal septentrional* = résident localement fréquent, menacé par les cures vétérinaires au bétail.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: 19 en avril 1992) et nicheur.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 28, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = résident localement commun et nicheur.

## PASSERIDAE

### 302. Moineau domestique

House Sparrow, *Passero domestico* – *Passer domesticus* \*\*

*Sénégal septentrional* = introduit dans le Sénégal autour de 1970, aujourd'hui est un commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 20 en avril 1994), dans le Parc pour la première fois en février 1987, et rare avant le 1990.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = commun à Dakar.

*Gambie* = observé la première fois en 1982-1983, aujourd'hui est un commun résident et nicheur.

### 303. Moineau gris

Northern Grey-headed Sparrow, *Passero testa grigia* - *Passer griseus*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun (n. max. 1984-1994: 6).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 72,

Petite Côte 54, Dakar 6.

*Gambie* = résident très commun et nicheur, entre avril et décembre.

### 304. Moineau doré

Golden Sparrow, Passero dorato - *Passer luteus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical très commun (n. max. 1984-1994: env. 5.000 en février 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 179, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = observé la première fois en 1976, aujourd'hui est un visiteur irrégulier dans la saison sèche (n. max. 200-400 en janvier-mars 1988), entre novembre et juin, et nicheur (entre avril et décembre).

## PLOCEIDAE

### 305. Alecto à bec blanc

White-bellied Buffalo-weaver, Tessitore dei bufali becco bianco –

*Bubalornis albirostris*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum plus que 1.500, Petite Côte 75, Dakar 0.

*Gambie* = commun résident, présent en août-décembre, et nicheur (en juillet-novembre).

### 306. Tissérin minule

Little Weaver, Tessitore piccolo mascherato - *Ploceus luteolus* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical peu nombreux (n. max. 1984-1994: 3).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février.

*Gambie* = fréquent résident localisé et nicheur, entre juillet et novembre

### 307. Tissérin à tête rousse

Vitelline Masked Weaver, Tessitore mascherato africano - *Ploceus velatus* \*\*

[syn. *Ploceus vitellinus*]

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présente toute l'année.

*Gambie* = résident et nicheur (entre juillet et novembre) peu nombreux et localisé.

### **308. Tissérin gendarme**

Village Weaver, Gendarme - *Ploceus cucullatus*

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = rare nicheur afrotropical.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = juillet-août et octobre-novembre.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 0, Dakar 5.

*Gambie* = résident très commun et nicheur colonial, en août-novembre.

### **309. Tissérin à tête noire**

Black-headed Weaver, Tessitore testa nera - *Ploceus melanocephalus* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical très commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Gambie* = résident et nicheur (entre août et octobre) très commun.

### **310. Travailleur à bec rouge**

Red Billed Quelea, Quelea becco rosso - *Quelea quelea*

*Sénégal septentrional* = résident très commun (seulement pendant la période de la nidification) et migrateur intra-africain.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical très commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 174, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = aujourd'hui rare visiteur, irrégulier dans la saison sèche (entre octobre et mai).

### **311. Euplecte vorabé**

Yellow-crowned Bishop, Vescovo dorato - *Euplectes afer*

*Sénégal septentrional* = résident commun mais localisé.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = commun nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: exceptionnel env. 5.000 en mars 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.



*Gambie* = résident localement commun et nicheur, en septembre-novembre.

## ESTRILDIDAE

### **312. Amarante du Sénégal**

Senegal Fire-finch, Amaranto becco rosso - *Lagonosticta senegala* \*\*

*Sénégal septentrional* = commun résident.



**Gobemouche gris (284)**

Spotted Flycatcher, Pigliamosche – *Muscicapa striata*

**Gobemouche noir (285)**

Pied Flycatcher, Balia nera – *Ficedula hypoleuca*

**Pie-grièche à tête rousse (293)**

Woodchat Shrike, Averla capirossa – *Lanius senator*

**Loriot d'Europe (295)**

European Golden Oriole, Rigogolo – *Oriolus oriolus*

**Bruant ortolan (322)**

Ortolan Bunting, Ortolano - *Emberiza hortulana*

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 21 en mars 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 18, Petite Côte 0, Dakar plusieurs exemplaires.

*Gambie* = résident très commun et nicheur.

### 313. Bec-de-coral cendré

Black-rumped Waxbill, Astrilde becco di corallo - *Estrilda troglodytes* \*\*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = février et mars.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 4, Petite Côte 0, Dakar 0.

*Gambie* = fréquent résident et probable nicheur.

### 314. Cordonbleu à joues rouges

Red-checked Cordon-bleu, Cordon blu guance rosse – *Uraeginthus bengalus*

[syn. *Estrilda bengala*]

*Sénégal septentrional* = commun résident.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical pas commun.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = commun résident et nicheur, en avril-juin et surtout pendant les pluies, entre juillet et octobre.

### 315. Bengali zébré

Zebra Waxbill, Bengalino petto dorato - *Amandava subflava*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent mais localisé.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 30).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = avant commun et aujourd'hui rare migrateur intra-africain pendant la saison sèche.

### 316. Astrild-caille à lunettes

African Quailfinch, Astro quaglia africano - *Ortygospiza atricollis*

*Sénégal septentrional* = commun résident localisé et nicheur, en septembre-décembre.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical fréquent (n. max. 1984-1994: env. 20 en décembre 1991 et en avril 1993).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Gambie* = commun résident et nicheur.

### 317. Capucin bec-d'argent

African Silverbill, Becco d'argento africano - *Lonchura cantans*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent, localement peu nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 49 en mars 1992).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 22, Petite Côte 8, Dakar 10.

*Gambie* = résident peu nombreux et nicheur, entre septembre et mai.

## VIDUIDAE

### 318. Combassou du Sénégal

Senegal Indigobird, Uccello indaco dei villaggi - *Vidua chalybeata*

*Sénégal septentrional* = résident fréquent.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = fréquent nicheur afrotropical (n. max. 1984-1994: 15 en février 1990).

*Présence dans le Parc du Djoudj* = toute l'année.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 0, Petite Côte 0, Dakar env. 6.

*Gambie* = commun résident et nicheur.

### 319. Veuve à collier d'or

Broad-tailed Paradise Whydah, Vedova orientale - *Vidua orientalis*

*Sénégal septentrional* = résident peu nombreux.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare en février-avril.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = entre février et avril.

*Gambie* = résident et nicheur peu nombreux.

## FRINGILLIDAE

### 320. Serin à croupion blanc

Grey Canary, Verzellino groppone bianco - *Serinus leucopygius*

*Sénégal septentrional* = peu nombreux et localement commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = nicheur afrotropical pas commun entre novembre et la moitié de janvier (n. max. 1984-1994: 6), plus rare en février-mars.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = nicheur, présent entre décembre et février.

*Delta du Sine-Saloum et Petite Côte (janvier 1997)* = Delta du Sine-Saloum 31, Petite Côte 7, Dakar 2.

*Gambie* = fréquent résident et probable nicheur.

### 321. Serin du Mozambique

Yellow-fronted Canary, Canarino del Mozambico - *Serinus mozambicus*

*Sénégal septentrional* = résident localement commun.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = afrotropical rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = janvier et février.

*Gambie* = commun résident et nicheur (entre juin et octobre), présent en octobre-novembre aussi.

## EMBERIZIDAE

### 322. Bruant ortolan

Ortolan Bunting, Ortolano - *Emberiza hortulana* \*\*

*Sénégal septentrional* = rare migrateur et hivernant européen.

**Parc National des Oiseaux du Djoudj** = migrateur européen rare.

*Présence dans le Parc du Djoudj* = avril.

*Gambie* = migrateur européen très rare.

# Index

## A

- Acrocephalus arundinaceus* (258)  
- *baeticatus* (259)  
- *paludicola* (254)  
- *palustris* (256)  
- *schoenobaenus* (255)  
- *scirpaceus* (257)  
*Actitis hypoleucos* (147)  
*Actophilornis africana* (107)  
Agrobate podobé (241)  
- roux (240)  
Aigle botté (82)  
- de Bonelli (80)  
- de Wahlberg (79)  
- fascié (81)  
- martial (83)  
- ravisser (78)  
Aigrette à gorge blanche (17)  
- ardoisée (16)  
- garzette (18)  
- grande (20)  
- intermédiaire (19)  
Airone bianco maggiore (20)  
- cenerino (22)  
- golia (24)  
- guardabuoi (14)  
- rosso (21)  
- striato (15)  
- testanera (23)  
*Alaemon alaudipes* (217)  
Albanella minore (73)  
- *pallida* (72)  
Albastrello (143)  
*Alcedo cristata* (197)  
- *quadribrachys* (198)  
Alecto à bec blanc (305)  
Allodola becco curvo (217)  
- canora (216)  
- capinera (221)  
- orecchie bianche (221)  
*Alopochen aegyptiacus* (41)  
Alouette calandrelle (218)  
- chanteuse (216)  
Alzavola (49)  
*Amandava subflava* (315)  
Amarante du Sénégal (312)  
Amaranto becco rosso (312)  
*Amaurornis flavirostris* (99)  
*Anas acuta* (51)  
- *americana* (47)  
- *clypeata* (54)  
- *crecca* (49)  
- *discors* (53)  
- *penelope* (46)  
- *platyrhynchos* (50)  
- *querquedula* (52)  
- *strepera* (48)  
Anatra dal bernoccolo (44)  
- dorso bianco (40)  
- fischiatrice facciabianca (39)  
- fischiatrice fulva (38)  
- marmorizzata (55)  
Anhinga d'Afrique (6)  
- *rufa* (6)  
Aninga africana (6)  
Ant-chat (250)  
*Anthreptes platyura* (289)  
*Anthus campestris* (232)  
- *cervinus* (236)  
- *leucophrys* (234)  
- *similis* (233)  
- *trivialis* (232)  
*Apus affinis* (192)  
- *apus* (191)  
- *pallidus* (190)  
Aquila del Bonelli (80)  
- di Wahlberg (79)  
- marziale (83)  
- minore africana (81)  
- minore eurasiatica (82)  
- pescatrice africana (64)  
- rapace (78)  
- *rapax* (78)  
- *wahlbergi* (79)  
*Ardea cinerea* (22)  
- *goliath* (24)  
- *melanocephala* (23)  
- *purpurea* (21)  
*Ardeola ralloides* (13)  
*Ardeotis arabs* (105)  
*Arenaria interpres* (148)  
*Asio capensis* (183)  
- *flammeus* (182)

- Assiolo (178)  
 - africano (179)  
 - faccia bianca (180)  
 Astore canoro scuro (75)  
 Astrild-caille à lunettes (316)  
 Astrilde becco di corallo (313)  
 Astro quaglia africano (316)  
 Autour sombre (75)  
 Averla capirossa (293)  
 - isabellina (291)  
 - maggiore meridionale (292)  
 Avocet, pied (110)  
 Avocetta (110)  
 Avocette (110)  
*Aythya ferina* (56)  
 - *fuligula* (58)  
 - *nyroca* (57)
- B**
- Balbuzard pêcheur (59)  
*Balearica pavonina* (104)  
 Balestruccio (228)  
 Balia nera (285)  
 Ballerina bianca (231)  
 - gialla (230)  
 Barbagianni (177)  
 Barbet, Vieillot's (212)  
 Barbican de Vieillot (212)  
 Barbuto di Vieillot (211)  
 Barge à queue noire (137)  
 - rousse (138)  
 Barn Owl (177)  
 Batis du Sénégal (287)  
 - Senegal (287)  
 - *senegalensis* (287)  
 Bécasseau à poitrine cendrée (131)  
 - cocorli (132)  
 - de Temminck (130)  
 - maubèche (128)  
 - minute (129)  
 - variable (133)  
 Bécassine des marais (136)  
 - sourde (135)  
 Beccaccia dorata maggiore (108)  
 Beccaccino (136)  
 Beccafico (274)  
 Beccamoschino (264)  
 - del deserto (265)  
 - del Natal (263)  
 - dorso nero (262)  
 - vocifero (267)  
 Beccapesci (156)  
 Becco a sella africano (30)  
 Becco d'argento africano (317)  
 Bec-de-coral cendré (313)  
 Bee-eater, blue cheeched (203)  
 - european (204)  
 - little (200)  
 - little green (202)  
 - northern carmine (205)  
 - white throated (201)  
 Bengalino petto dorato (315)  
 Bengali zébré (315)  
 Bergeronnette grise (231)  
 - des ruisseaux (230)  
 - printanière (229)  
 Biancone (70)  
 - bruno (71)  
 Bigia grossa (273)  
 - padovana (272)  
 Bigiarella (268)  
 Bihoreau gris (12)  
 Bishop, yellow-crowned (311)  
 Bittern, dwarf (11)  
 - eurasian (9)  
 - little (10)  
 Blackcap (275)  
 Blongiois de Sturm (11)  
 - nain (10)  
 Bluethroat (240)  
 Bondrée apivore (60)  
*Botaurus stellaris* (9)  
 Bruant hortolan (322)  
 Brubru (294)  
 - africain (294)  
*Bubalornis albirostris* (305)  
*Bubo lacteus* (181)  
*Bubulcus ibis* (14)  
 Bucero becco rosso (210)  
 - nasuto (211)  
 Bufaga becco giallo (301)  
 Buffalo-weaver, white-bellied (305)  
 Bulbul commun (237)  
 - garden (237)

- gola nera (237)  
 Bunting, ortolan (322)  
*Buphagus africanus* (301)  
*Burhinus capensis* (113)  
   - *oediconemus* (111)  
   - *senegalensis* (112)  
 Busard cendré (73)  
   - des roseaux (74)  
   - pâle (72)  
 Buse féroce (77)  
   - variable (76)  
 Bush Lark, singing (216)  
 Bustard, arabian (105)  
   - white-bellied (106)  
*Buteo buteo* (76)  
   - *rufinus* (77)  
 Butor étoilé (9)  
*Butorides striatus* (15)  
 Button-quail, little (95)  
 Buzzard, common (76)  
   - european honey (60)  
   - long-legged (77)

## C

Caille arlequin (93)  
   - des blés (92)  
 Calandrella (218)  
   - *brachydactyla* (218)  
 Calandro (232)  
   - dai sopraccigli bianchi (234)  
 Calao, petit à bec noire (211)  
   - petit à bec rouge (210)  
*Calidris alpina* (133)  
   - *canutus* (128)  
   - *ferruginea* (132)  
   - *melanotos* (131)  
   - *minuta* (129)  
   - *temminckii* (130)  
*Camaroptera brachyura* (268)  
   - *brevicaudata* (268)  
   - grey-backed (268)  
 Camaroptère à tête grise (268)  
 Camarottera dorso grisio (268)  
 Canapiglia (48)  
 Canapino (260)  
   - pallido (261)  
 Canard à front blanc (47)

- casqué (44)  
 - chipeau (48)  
 - colvert (50)  
 - pilet (51)  
 - siffleur (46)  
 - souchet (54)  
 Canarino del Mozambico (321)  
 Canary, grey (320)  
   - yellow-fronted (321)  
 Cannaiola (257)  
   - *africana* (259)  
   - *verdognola* (256)  
 Cannareccione (258)  
 Capinera (275)  
 Capovaccaio (65)  
   - *pileato* (66)  
 Cappellaccia (219)  
*Caprimulgus climacurus* (184)  
   - *aegyptius* (186)  
   - *eximius* (185)  
   - *ruficollis* (187)  
 Capucin bec-d'argent (317)  
*Casmerodius albus* (20)  
 Cavaliere d'Italia (109)  
*Centropus senegalensis* (176)  
*Cercotrichas galactotes* (240)  
   - *podobe* (241)  
*Ceryle rudis* (199)  
*Chalcomitra senegalensis* (279)  
 Chanting Goshawk, dark (75)  
*Charadrius alexandrinus* (121)  
   - *dubius* (118)  
   - *hiaticula* (119)  
   - *pecuarius* (120)  
*Chelictina riocourii* (62)  
 Chevalier aboyeur (144)  
   - arlequin (141)  
   - culblanc (145)  
   - combattant (134)  
   - gambette (142)  
   - guignette (147)  
   - stagnatile (143)  
   - sylvain (146)  
 Chiffchaff (273)  
 Chiurlo maggiore (140)  
   - piccolo (139)  
*Chlidonias hybridus* (159)

- *leucopterus* (161)
- *niger* (160)
- Chrysococcyx caprius* (175)
  - *klaas* (174)
- Cicogna bianca (28)
  - collo lanoso (29)
  - nera (27)
- Ciconia ciconia* (28)
  - *episcopus* (29)
  - *nigra* (27)
- Cigogne blanche (28)
  - épiscopale (29)
  - noire (27)
- Cinnyris pulchellus* (290)
- Circaète de Beaudouin (71)
  - Jean-le-Blanc (70)
- Circaetus cinereus* (71)
  - *gallicus* (70)
- Circus aeruginosus* (74)
  - *macrourus* (72)
  - *pygargus* (73)
- Cisticola aridulus* (265)
  - croaking (263)
  - desert (265)
  - *galactotes* (262)
  - *juncidis* (264)
  - *natalensis* (263)
  - winding (262)
  - zitting (264)
- Cisticole des joncs (264)
  - du desert (265)
  - roussâtre (262)
  - striée (263)
- Clamator glandarius* (172)
- Cochevis huppé (219)
- Codiroso (243)
  - spazzacamino (242)
- Codone (51)
- Coliou à nuque belu (193)
- Collared Dove, african (168)
- Colomba di Guinea (165)
- Columba guinea* (165)
- Combassou du Sénégal (318)
- Combattente (134)
- Coot, eurasian (192)
- Coracias abyssinica* (206)
  - *garrulus* (207)
- Corbeau brun (296)
  - pie (297)
- Cordonbleu à joues rouges (314)
  - red-cheeked (314)
- Cordon blu guance rosse (314)
- Cormoran, africain (5)
  - grand (4)
- Cormorano (4)
  - africano (5)
- Cormorant, long-tailed (5)
  - white-breasted (4)
- Corriere grosso (119)
  - piccolo (118)
  - di Kittlitz (120)
- Corrione biondo (115)
  - di Temminck (116)
- Corvo bianco e nero (297)
  - collo bruno (296)
- Corvus albus* (297)
  - *ruficollis* (296)
- Coturnix coturnix* (92)
  - *delegorguei* (93)
- Coucal du Sénégal (176)
  - Senegal (176)
- Coucou de Klaas (174)
  - didric (175)
  - geai (172)
  - gris (173)
- Courlis cendré (140)
  - corlieu (139)
- Courseur, cream-coloured (115)
  - Temminck's (116)
- Courvite de Temminck (116)
  - isabelle (115)
- Crake, african (96)
  - black (99)
  - little (98)
  - spotted (97)
- Crane, black crowned (104)
- Crecopsis egregia* (96)
- Crex egregia* (96)
- Crombec (271)
  - northern (271)
- Crow, brown-necked (296)
  - pied (297)
- Cuckoo, common (173)
  - didric (175)

- great spotted (172)
- yellow-billed (174)
- Cuculo (173)
  - dal ciuffo (172)
  - dorato di Klaas (174)
  - dorato di Levaillant (175)
  - fagiano del Senegal (176)

*Cuculus canorus* (173)

- Culbianco (246)
  - isabellino (249)

- Curlew, eurasian (140)
  - stone (111)

- Cursorius cursor* (115)
  - *temminckii* (116)

Cutrettola (229)

*Cypsiurus parvus* (189)

## D

Darter (6)

*Delichon urbica* (228)

- Dendrocygna bicolor* (38)
  - *viduata* (39)

- Dendrocygne à dos blanc (40)
  - fauve (38)
  - veuf (39)

*Dendropicos goertae* (215)

- Dove, african collared (168)
  - black-billed wood (163)
  - european turtle (169)
  - laughing (170)
  - mourning (166)
  - namaqua (164)
  - vinaceous (167)

- Duck, ferruginous (57)
  - fulvous whistling (38)
  - knob-billed (44)
  - tufted (58)
  - white-backed (40)
  - white-faced whistling (39)

Dunlin (133)

## E

- Eagle, african hawk (81)
  - Bonelli's (80)
  - booted (82)
  - brown snake (71)
  - martial (83)

- Owl, Verreaux's (181)
- river (64)
- short-toed snake (70)
- tawny (78)
- Wahlberg's (79)

Échasse blanche (109)

Effraie des clochers (177)

- Egret, cattle (14)
  - great (20)
  - intermediate (19)
  - little (18)
  - western reef (17)

*Egretta alba* (20)

- *ardesiaca* (16)
- *garzetta* (18)
- *gularis* (17)
- *intermedia* (19)

Élanion blanc (61)

- naucler (62)

*Elanus caeruleus* (61)

*Emberiza hortulana* (322)

- Engoulevent à balanciers (188)
  - à collier roux (187)
  - à longue queue (184)
  - doré (185)
  - du désert (186)

*Ephippiorhynchus senegalensis* (30)

- Eremomela, grey-backed (269)
  - *icteropygialis* (269)
  - piccola (270)
  - *pusilla* (270)
  - Senegal (270)
  - ventre giallo (269)

- Erémomèle à croupion jaune (269)
  - à dos vert (270)

*Eremopterix leucotis* (220)
 

- *nigriceps* (221)

*Estrilda bengala* (314)
 

- *trogodytes* (313)

*Euplectes afer* (311)

Euplecte vorabé (311)

*Eupodotis senegalensis* (106)

## F

- Falco ardosiaceus* (86)
  - *biarmicus* (89)
  - *chiquera* (87)

- di Barberia (91)
  - di palude (74)
  - *naumanni* (84)
  - pecchiaiolo (60)
  - *pelegrinoides* (91)
  - *peregrinus* (90)
  - pescatore (59)
  - *subbuteo* (88)
  - testa rossa (87)
  - *tinnunculus* (85)
  - Falcon, Barbary (91)
    - red-necked (87)
  - Faucon ardoisé (86)
    - chiquera (87)
    - crécerelle (85)
    - crécerellette (84)
    - de Barbarie (91)
    - hobereau (88)
    - lanier (89)
    - pélerin (90)
  - Fauvette à lunettes (280)
    - à tête noire (274)
    - babillard (277)
    - des jardins (273)
    - épervière (271)
    - grisette (275)
    - mélanocéphale (269)
    - orphée (272)
    - passerinette (279)
  - Fenicottero minore (37)
    - rosa (36)
  - Ficedula parva* (286)
    - *hypoleuca* (285)
  - Finch-lark, chestnut-backed (220)
    - white-fronted (221)
  - Fire-finch, Senegal (312)
  - Fischione (46)
    - americano (47)
  - Flamant, petit (37)
    - rose (36)
  - Flamingo, lesser (37)
    - greater (36)
  - Flycatcher, pied (285)
    - red-breasted (286)
    - spotted (284)
  - Folaga (103)
  - Forapaglie (255)
    - macchiettato (253)
  - Foulque macroule (103)
  - Francolin, double spurred (94)
    - à double éperon (94)
  - Francolino dal doppio sperone (94)
  - Francolinus bicalcaratus* (94)
  - Fraticeppo (158)
  - Fratino (121)
  - Frullino (135)
  - Fulica atra* (103)
  - Fuligule milouin (56)
    - morillon (58)
    - nyroca (57)
- ## G
- Gabbiano comune (150)
    - roseo (151)
    - testa grigia (149)
  - Gadwall (48)
  - Galerida cristata* (219)
  - Gallinago gallinago* (136)
  - Gallinella d'acqua (102)
    - nera (99)
  - Gallinula chloropus* (102)
  - Gallinule, Allen's (100)
  - Gambecchio (129)
    - nano (130)
  - Ganga à ventre brun (162)
  - Garganey (52)
  - Garzetta (18)
    - ardesia (16)
    - dei reef occidentale (17)
    - intermedia (19)
  - Gelochelidon nilotica* (153)
  - Gendarme (308)
  - Germano reale (50)
  - Gheppio (85)
    - ardesia (86)
  - Ghiandaia marina (207)
    - marina abissina (206)
  - Glareola pratincola* (117)
  - Glaréole à collier (117)
  - Glossy Starling, blue-eared (298)
    - long-tailed (299)
  - Gobemouche gris (284)
    - nain (286)
    - noir (285)

Godwit, bar-tailed (138)  
     - black-tailed (137)  
 Goéland brun (152)  
     - railleur (151)  
 Golden Plover, european (122)  
 Goose, african pygmy (45)  
     - egyptian (41)  
     - spur-winged (43)  
 Gorgebleue (239)  
 Goshawk, dark chanting (75)  
 Grand-duc de Verreaux (181)  
 Grandule ventre castano (162)  
 Gravelot à collier interrompu (121)  
     - grand (119)  
     - pâte (120)  
     - petit (118)  
 Grebe / Grèbe a cou noir (3)  
     - black-necked (3)  
     - castagneaux (1)  
     - great crested (2)  
     - huppé (2)  
     - little (1)  
 Greenshank (144)  
 Griffon Vulture, european (69)  
     - Rüppell's (68)  
 Grifone africano (67)  
     - di Rüppell (68)  
     - eurasiatico (69)  
 Grillaio (84)  
 Gruccione (204)  
     - carminio (205)  
     - gola bianca (201)  
     - guance blu (203)  
     - petto canella minore (200)  
     - verde piccolo (202)  
 Grue couronnée (104)  
 Gru pavinina (104)  
 Guardiano del cocodrillo (114)  
 Guépier à gorge blanche (201)  
     - de Perse (203)  
     - d'Europe (204)  
     - d'orient (202)  
     - écarlatte (205)  
     - nain (200)  
 Gufo di palude (183)  
     - di palude africano (183)  
     - latteo (181)

Guifette leucoptère (161)  
     - moustac (159)  
     - noire (160)  
 Gull, black-headed (150)  
     - grey-headed (149)  
     - lesser black-backed (152)  
     - slender-billed (151)  
*Gyps africanus* (67)  
     - *fulvus* (69)  
     - *rueppelli* (68)

## H

*Halcyon chelicuti* (196)  
     - *leucocephala* (194)  
     - *senegalensis* (195)  
*Haliaeetus vocifer* (64)  
 Hammerkop (25)  
 Harrier, eurasian marsh (74)  
     - Montagu's (73)  
     - pallid (72)  
 Hawk Eagle, african (81)  
*Hedydipna platura* (289)  
 Heron / Héron, black (16)  
     - black-headed (23)  
     - cendré (22)  
     - crabier (13)  
     - gardeboeufs (14)  
     - goliath (24)  
     - green (15)  
     - grey (22)  
     - mélanocéphale (23)  
     - pourprée (21)  
     - purple (21)  
     - squacco (13)  
     - strié (15)  
 Hibou des marais (182)  
     - du Cap (183)  
*Hieraaetus fasciatus* (80)  
     - *pennatus* (82)  
     - *spilogaster* (81)  
*Himantopus himantopus* (109)  
*Hippolais pallida* (261)  
     - *polyglotta* (260)  
 Hirondelle de fenêtre (228)  
     - de Guinée (226)  
     - de rivage (223)  
     - des mosquées (224)

- paludicole (222)
- rousseline (225)
- rustique (227)
- Hirundo daurica* (225)
  - *lucida* (226)
  - *rustica* (227)
  - *senegalensis* (224)
- Hobby, eurasian (88)
- Honey Buzzard, european (60)
- Honeyguide, greater (213)
- Hoopoe (209)
- Hoopoe Lark (217)
- Hornbill, grey (211)
  - red-billed (210)
- Huppe fasciée (211)
- Hypolaïs pâle (261)
  - polyglotte (260)

## I

- Ibis falcinelle (32)
  - glossy (32)
  - sacré (33)
  - sacred (33)
  - sacro (33)
  - tantale (26)
- Indicatore gola nera (213)
- Indicator indicator* (213)
- Indicateur, grand (213)
- Indigobird, Senegal (318)
- Irrisor moqueur (207)
- Ixobrychus minutus* (10)
  - *sturmii* (11)

## J

- Jabiru d'Afrique (30)
- Jacana africana (107)
  - à poitrine dorée (107)
- Jynx torquilla* (214)

## K

- Kestrel, common (85)
  - lesser (84)
  - grey (86)
- Kingfisher, grey-headed (194)
  - malachite (197)
  - pied (199)
  - Senegal (195)
  - shining blue (198)

- striped (196)
- Kite, black (63)
  - black-shouldered (61)
  - shallow-tailed (62)
- Knot, red (128)

## L

- Lagonosticta senegala* (312)
- Lamprotornis caudatus* (299)
  - *chalybaeus* (298)
  - *pulcher* (300)
- Lanario (89)
- Lanius isabellinus* (291)
  - *meridionalis* (292)
  - *senator* (293)
- Lanner (89)
- Lapwing, black-headed (125)
  - northern (127)
  - spur-winged (126)
  - wattled Senegal (124)
- Lark, bush singing (216)
  - crested (219)
  - hoopoe (217)
  - short-toed (218)
- Larus cirrhocephalus* (149)
  - *fuscus* (152)
  - *genei* (151)
  - *ridibundus* (150)
- Leptoptilos crumeniferus* (31)
- Limosa lapponica* (138)
  - *limosa* (137)
- Lilytrotter (107)
- Locustella naevia* (253)
  - *luscinioides* (252)
- Locustelle luscinioides (252)
  - tachetée (253)
- Lodolaio (88)
- Lonchura cantans* (317)
- Loriot d'Europe (295)
- Lui bianco (283)
  - grosso (281)
  - piccolo (282)
- Luscinia megarhynchos* (238)
  - *svecica* (239)
- Lybius vieilloti* (212)
- Lymnocyptes minimus* (135)

## M

- Macrodipteryx longipennis* (188)  
Mallard (50)  
Marabout d'Afrique (31)  
Marabù (31)  
*Marmaronetta angustirostris* (55)  
Marouette noire (99)  
- ponctuée (97)  
- poussin (98)  
Marsh Harrier, eurasian (74)  
Marsh Owl, african (183)  
Martin, african sand (222)  
- european sand (223)  
- house (229)  
Martin-chasseur à tête grise (194)  
- du Sénégal (195)  
- strié (196)  
Martinet des maisons (193)  
- des palmiers (189)  
- noir (191)  
- pâle (190)  
Martin-pêcheur azure (198)  
- huppé (197)  
- pie (199)  
Martin pescatore bianco e nero (199)  
- di bosco (195)  
- malachite (197)  
- splendente (198)  
- striato (196)  
- testa grigia (194)  
Marzaiola (52)  
- americana (53)  
*Melierax metabates* (75)  
Merle bleu (251)  
Merle métallique à longue queue (299)  
- à oreillons bleus (298)  
- à ventre roux (300)  
*Merops albicollis* (201)  
- *apiaster* (204)  
- *nubicus* (205)  
- *orientalis* (202)  
- *persicus* (203)  
- *pusillus* (200)  
Mestolone (54)  
*Mesophoyx intermedia* (19)  
Mignattaio (32)  
Mignattino (160)  
- alibianche (161)  
- piombato (159)  
Milan noir (63)  
*Milvus migrans* (63)  
*Mirafra cantillans* (216)  
Moineau domestique (302)  
- doré (304)  
- gris (303)  
Moinelette à front blanc (221)  
- à oreillons blancs (220)  
Monachella (247)  
- del deserto (248)  
*Monticola solitaria* (251)  
Moorhen (102)  
Moretta (58)  
- tabaccata (57)  
Moriglione (56)  
*Motacilla alba* (231)  
- *cinerea* (230)  
- *flava* (229)  
Mouette à tête grise (149)  
- rieuse (150)  
Mousebird, blue-naped (194)  
*Muscicapa striata* (284)  
*Mycteria ibis* (26)  
*Myrmecocichla aethiops* (249)

## N

- Necrosyrtes monachus* (66)  
*Nectarinia pulchella* (290)  
- *senegalensis* (288)  
*Neophron percnopterus* (65)  
*Nettapus auritus* (45)  
Nettarinia multicolore (290)  
- pettirossa (288)  
- pigmea (289)  
Nibbio bianco (61)  
- bruno (63)  
- coda di forbice (62)  
Night-heron, black-crowned (12)  
Nightingale (238)  
Nightjar, egyptian (186)  
- long-tailed (184)  
- golden (185)  
- red-necked (187)

- standard-winged (188)  
*Nilaus afer* (294)  
 Nitticora (12)  
*Numenius arquata* (140)  
 - *phaeopus* (139)  
*Nycticorax nycticorax* (12)

## O

Oca dallo sperone (43)  
 - egiziana (41)  
 - pigmea africana (45)  
 Occhiocotto (279)  
 Occhione (111)  
 - del Capo (113)  
 - del Senegal (112)  
 Oedicnème criard (111)  
 - du Sénégal (112)  
 - tachard (113)  
*Oena capensis* (164)  
*Oenanthe deserti* (248)  
 - *hispanica* (247)  
 - *isabellina* (249)  
 - *oenanthe* (246)  
 Oie-armée de Gambie (43)  
 Oie d'Égypte (41)  
 Ombrette africaine (25)  
 Oriole, european golden (295)  
*Oriolus oriolus* (295)  
 Ortolan Bunting (322)  
 Ortolano (322)  
*Ortygospiza atricollis* (316)  
 Osprey (59)  
 Otarda araba (105)  
 - del Senegal (106)  
*Otus leucotis* (180)  
 - *scops* (178)  
 - *senegalensis* (179)  
 Outarde arabe (105)  
 - du Sénégal (106)  
 Owl, african marsh (183)  
 - barn (177)  
 - african scops (179)  
 - european scops (178)  
 - short-eared (182)  
 - Verreaux's eagle (181)  
 - white-faced (180)  
 Oxpecker, yellow-billed (301)

## P

Pagliarolo (255)  
 Palm Swift, african (189)  
*Pandion haliaetus* (59)  
 Pantana (144)  
 Parakeet, rose-ringed (171)  
 Parrocchetto dal collare (171)  
*Passer domesticus* (302)  
 - *griseus* (303)  
 - *luteus* (304)  
 Passero domestico (302)  
 - dorato (304)  
 - solitario (251)  
 - testa grigia (303)  
 Pavoncella (127)  
 - del Senegal (124)  
 - spinosa (126)  
 - testa nera (125)  
*Pelecanus onocrotalus* (7)  
 - *rufescens* (8)  
 Pelican / Pélican blanc (7)  
 - great white (7)  
 - gris (8)  
 - pink-backed (8)  
 Pellegrino (90)  
 Pellicano (7)  
 - rossiccio (8)  
 Peregrine (90)  
 Pernice di mare (117)  
*Pernis apivorus* (60)  
 Perruche à collier (171)  
 Petit-duc à face blanche (180)  
 - africain (179)  
 - scops (178)  
 Pettazzurro (239)  
 Pettegola (142)  
*Phalacrocorax africanus* (5)  
 - *carbo* (4)  
*Philomachus pugnax* (134)  
*Phoeniconaias minor* (37)  
*Phoenicopterus ruber* (36)  
*Phoeniculus purpureus* (208)  
*Phoenicurus ochruros* (242)  
 - *phoenicurus* (243)  
 Phragmite aquatique (254)  
 - des joncs (255)  
*Phylloscopus bonelli* (274)

- *collybita* (273)
  - *trochilus* (272)
  - Picchio di Goerta (215)
  - Pic gris (215)
  - Pie-grièche à tête rousse (293)
    - isabelle (291)
    - méridionale (292)
  - Pigeon de Guinée (165)
    - speckled (165)
  - Pigliamosche (284)
    - del Senegal (287)
    - pettirosso (286)
  - Piovanello (132)
    - maggiore (128)
    - pancianera (133)
  - Pintail, northern (51)
  - Pipit à dos uni (234)
    - à gorge rousse (236)
    - à long bec (233)
    - des arbres (235)
    - long-billed (233)
    - plain-backed (234)
    - red-throated (236)
    - rousseline (232)
    - tawny (232)
    - tree (235)
  - Piquebœuf à bec jaune (301)
  - Piro piro boschereccio (146)
    - culbianco (145)
    - pettorale (131)
    - piccolo (147)
  - Pispola a becco lungo (233)
    - gola rossa (236)
  - Pittima minore (138)
    - reale (137)
  - Piviere dorato (122)
  - Pivieressa (123)
  - Platalea alba* (35)
    - *leucorodia* (34)
  - Plectropterus gambensis* (43)
  - Plegadis falcinellus* (32)
  - Ploceus cucullatus* (308)
    - *luteolus* (306)
    - *melanocephalus* (309)
    - *velatus* (307)
    - *vitellinus* (307)
  - Plover, egyptian (114)
    - european golden (122)
    - grey (123)
    - kentish (121)
    - Kittlitz's (120)
    - little ringed (118)
    - ringed (119)
  - Pluvialis apricaria* (122)
    - *squatarola* (123)
  - Pluvian fluviatile (114)
  - Pluvianus aegyptius* (114)
  - Pluvier argenté (123)
    - doré (122)
  - Pochard, common (56)
  - Podiceps cristatus* (2)
    - *nigricollis* (3)
  - Poiana (76)
    - coda bianca (77)
  - Polemaetus bellicosus* (83)
  - Pollo sultano (101)
    - di Allen (100)
  - Porphyrio alleni* (100)
    - *porphyrio* (101)
  - Porzana parva* (98)
    - *porzana* (97)
  - Pouillot de Bonelli (283)
    - fitis (281)
    - véloce (282)
  - Poule d'eau (102)
  - Pratincole (117)
  - Prinia à front écaillé (267)
    - aquatique (266)
    - del lago Ciad (266)
    - *fluviatilis* (266)
    - river (266)
  - Prispolone (235)
  - Psittacula krameri* (171)
  - Pterocles exustus* (162)
  - Ptilopsis leucotis* (180)
  - Pycnonotus barbatus* (237)
  - Pygargue vocifer (64)
  - Pygmy Goose, african (45)
- ## Q
- Quaglia (92)
    - arlecchino (93)
    - tridattila (95)
  - Quail, arlequin (93)

- common (92)
- Quailfinch, african (316)
- Quelea becco rosso (310)
  - *quelea* (310)
  - red billed (310)

## R

- Râle des prés (96)
  - Recurvirostra avosetta* (110)
  - Redshank (142)
    - spotted (141)
  - Redstart (243)
    - black (242)
  - Reed Warbler, african (259)
    - european (257)
    - great (258)
  - Rhynchée peinte (108)
  - Rigogolo (295)
  - Riparia paludicola* (222)
    - *riparia* (223)
  - Rock-thrush, blue (251)
  - Roller, abyssinian (206)
    - european (207)
  - Rollier d'Abyssinie (206)
    - d'Europe (207)
  - Rondine (227)
    - del Senegal (224)
    - lucente (226)
    - rossiccia (225)
  - Rondone (191)
    - delle palme (189)
    - indiano (192)
    - pallido (190)
  - Rossignol philomèle (238)
  - Rostratula benghalensis* (108)
  - Rougequeue à front blanc (243)
    - noir (242)
  - Rousserolle africain (258)
    - effarvate (257)
    - turdoïde (258)
    - verderolle (256)
  - Ruff (134)
- ## S
- Salciaiola (252)
  - Saltimpalo (245)
  - Sandgrouse, chestnut-bellied (162)

- Sand Martin, african (222)
  - european (223)
- Sandpiper, common (147)
  - curlew (132)
  - green (145)
  - marsh (143)
  - pectoral (131)
  - wood (146)
- Sarcelle à ailes bleues (53)
  - à oreillons (54)
  - d'été (52)
  - d'hiver (49)
  - marbrée (55)
- Sarkidiornis melanotos* (44)
- Sassicola mangia formiche (250)
- Saxicola rubetra* (244)
  - *torquata* (245)
- Schiribilla (98)
  - africana (96)
- Scops Owl, african (179)
  - european (178)
- Scopus umbretta* (25)
- Scrub-robin, black (241)
  - rufous (240)
- Serin à croupion blanc (320)
  - du Mozambique (321)
- Serinus leucopygius* (320)
  - *mozambicus* (321)
- Sgarza ciuffetto (13)
- Shelduck, common (42)
- Shoveler, northern (54)
- Shrike, brubru (294)
  - isabelline (291)
  - southern grey (292)
  - woodchat (293)
- Silverbill, african (317)
- Silvietta settentrionale (271)
- Singing Lark, bush (216)
- Sirli du desert (217)
- Snake Eagle, brown (71)
  - short-toed (70)
- Snipe, common (136)
  - jack (135)
  - painted (108)
- Souimanga à logue queue (290)
  - à poitrine rouge (288)
  - pygmée (289)

- Sparrow, golden (304)  
 - house (302)  
 - northern grey-headed (303)
- Spatola (34)  
 - africana (35)
- Spatule blanche (34)  
 - d' Afrique (35)
- Spiloptila clamans* (267)
- Spoonbill, african (35)  
 - eurasian (34)
- Spotted Cuckoo, great (172)
- Spreo pulcher* (300)
- Starling, blue-eared glossy (298)  
 - chestnut-bellied (300)  
 - long-tailed glossy (299)
- Sterna albifrons* (158)  
 - *caspia* (154)  
 - comune (157)  
 - *hirundo* (157)  
 - maggiore (154)  
 - *maxima* (155)  
 - *nilotica* (153)  
 - reale (155)  
 - *sandvicensis* (156)  
 - zampe nere (153)
- Sterne caspienne (154)  
 - caugek (156)  
 - hansel (153)  
 - naine (158)  
 - pierregarin (157)  
 - royal (155)
- Sterpazzola (276)  
 - di Sardegna (280)
- Sterpazzolina (279)
- Stiaccino (244)
- Stilt, black-winged (109)
- Stint, little (129)  
 - Temminck's (130)
- Stonechat (245)
- Stone Curlew (111)
- Storno orecchie blu maggiore (298)  
 - splendente coda lunga (299)  
 - ventre castano (300)
- Stork, black (27)  
 - marabou (31)  
 - saddle-billed (30)  
 - yellow-billed (26)  
 - white (28)  
 - woolly-necked (29)
- Streptopelia decipiens* (166)  
 - *roseogrisea* (168)  
 - *senegalensis* (170)  
 - *turtur* (169)  
 - *vinacea* (167)
- Succiacapre coda lunga (184)  
 - collo rosso (187)  
 - dal bilanciare (188)  
 - dorato (185)  
 - isabellino (186)
- Sunbird, beautiful (290)  
 - pygmy (289)  
 - scarlet-breasted (288)
- Svasso maggiore (2)  
 - piccolo (3)
- Swallow, european (227)  
 - mosque (224)  
 - red-chested (226)  
 - red-rumped (225)
- Swampen, purple (101)
- Swift, african palm (189)  
 - common (191)  
 - little (192)  
 - pallid (190)
- Sylvia atricapilla* (275)  
 - *borin* (274)  
 - *cantillans* (279)  
 - *communis* (276)  
 - *conspicillata* (280)  
 - *curruca* (277)  
 - *hortensis* (273)  
 - *melanocephala* (278)  
 - *nisoria* (272)
- Sylvietta brachyura* (261)

## T

- Tachybaptus ruficollis* (1)
- Tadorna (42)  
 - *tadorna* (42)
- Tadorne de Belon (42)
- Talève d'Allen (100)  
 - sultane (101)
- Tantale ibis (26)
- Tantalo africano (26)
- Tarabusino (10)

- nano africano (11)
  - Tarabuso (9)
  - Teal, blue-winged (53)
    - green-winged (49)
    - marbled (55)
  - Tern, black (160)
    - caspian (154)
    - commomn (157)
    - gull-billed (153)
    - little (158)
    - royal (155)
    - sandwich (156)
    - whiskered (159)
    - white-winged (161)
  - Tessitore dei bufali becco bianco (305)
    - mascherato africano (307)
    - piccolo mascherato (306)
    - testa nera (300)
  - Thalassornis leuconotus* (40)
  - Thick-knee, Senegal (112)
    - spotted (113)
  - Threskiornis aethiopicus* (33)
  - Tissérin à tête noire (309)
    - à tête rousse (307)
    - gendarme (308)
    - minule (306)
  - Tockus erythrorhynchus* (210)
    - *nasutus* (211)
  - Topino (223)
    - africano (222)
  - Toricollo (214)
  - Torcol fourmilier (214)
  - Tortora abissina (163)
    - comune (169)
    - dal collare africana (168)
    - del Senegal (170)
    - lamentosa africana (166)
    - maschera di ferro (164)
    - vinacea (167)
  - Totano moro (141)
  - Tournepieuvre à collier (148)
  - Tourtelette à masque de fer (164)
    - d' Abyssinie (163)
  - Tourterelle des bois (169)
    - maillée (170)
    - pleureuse (166)
    - rieuse (168)
  - vineuse (167)
  - Traquet des prés (244)
    - du desert (248)
    - fourmillier brun (250)
    - isabelle (249)
    - motteux (246)
    - oreillard (247)
    - pâtre (245)
  - Travailleur à bec rouge (310)
  - Tree Pipit (235)
  - Tringa erythropus* (141)
    - *glareola* (146)
    - *nebularia* (144)
    - *ochropus* (145)
    - *stagnatilis* (143)
    - *totanus* (142)
  - Tuffetto (1)
  - Turnix d'Andalousie (95)
    - *sylvatica* (95)
  - Turnstone, ruddy (148)
  - Turale Dove, european (169)
  - Turtur abyssinicus* (163)
  - Tyto alba* (177)
- ## U
- Uccello indaco dei villaggi (318)
  - Uccello martello (25)
  - Uccello topo nuca blu (193)
  - Upupa (210)
    - arboricola purpurea (208)
    - *epops* (209)
  - Uraeginthus bengalus* (314)
  - Urocolius macrourus* (193)
  - Usignolo (238)
    - d' Africa (240)
    - podobè (241)
- ## V
- Vanellus senegallus* (124)
    - *spinosus* (126)
    - *tectus* (125)
    - *vanellus* (127)
  - Vanneau huppé (127)
    - à tête noire (125)
    - du Sénégal (124)
    - éperonné (126)
  - Vautour africain (67)

- charognard (66)
- de Rüppell (68)
- fauve (69)
- percnoptère (65)

Vedova orientale (319)

Verzellino groppone bianco (320)

Vescovo dorato (311)

Veuve à collier d'or (319)

*Vidua chalybeata* (318)

- *orientalis* (319)

Voltapietre (148)

Voltolino (97)

Vulture, african white-backed (67)

- egyptian (65)
- european griffon (69)
- hooded (66)
- Rüppell's griffon (68)

## W

Wagtail, grey (230)

- yellow (229)
- white (231)

Warbler, aquatic (254)

- african reed (249)
- barred (272)
- Bonelli's (274)
- cricket (267)
- european reed (257)
- garden (274)
- grasshopper (253)
- great reed (258)
- marsh (256)
- melodious (260)
- olivaceous (261)
- orphean (273)
- sardinian (269)
- Savi's (252)
- sedge (255)
- spectacled (271)
- subalpine (270)
- willow (272)

Wattled Lapwing, Senegal (124)

Waxbill, black-rumped (313)

- zebra (315)

Weaver, black-headed (309)

- little (306)
- village (308)
- vitelline masked (307)

Wheatear (246)

- desert (248)
- isabelline (249)
- spanish (247)

Whimbrel (139)

Whinchat (244)

Whistling Duck, fulvous (38)

- white faced (39)

Whitethroat, common (268)

- lesser (269)

Whydah, broad-tailed paradise (319)

Wigeon, american (47)

- eurasian (46)

Wood Dove, black-billed (163)

Wood-hoopoe, green (208)

Woodpecker, grey (215)

Wryneck, eurasian (214)

## Z

Zafferano (152)





**Riccardo Groppali**, directeur du Parc Adda Sud et professeur universitaire à Pavie et au Polytechnique de Milan, s'occupe de protection de l'environnement et de sa biodiversité, surtout en ce qui concerne la faune invertébrée et étudie tout spécialement l'avifaune des zones cultivées et des milieux naturels des plaines, l'écologie et l'éthologie des araignées et le contrôle biologique de certaines espèces d'insectes. Il a étudié l'environnement et les formes de gestion des Parcs et Réserves naturelles en Italie et à l'étranger, les modalités d'exploitation des zones ouvertes au public, les possibilités de récupération des milieux dégradés ; il a pris en charge la conception, du point de vue environnemental, des plans d'aménagement du paysage, des réseaux écologiques et des sentiers polyvalents et il collabore avec des musées, des revues et des associations naturalistes. Il est l'auteur de nombreux travaux scientifiques et de vulgarisation et a présenté des relations techniques dans plusieurs congrès nationaux et internationaux.

Fruit du jumelage réalisé en 2004 entre le Parc Djoudj, dans le delta du Sénégal, et le Parc Adda Sud, en Italie septentrionale, ce texte présente plus de 300 espèces d'oiseaux jusqu'à présent signalées dans le territoire africain protégé.

Le Parc Djoudj, une des zones les plus intéressantes du monde du point de vue ornithologique accueille en effet pendant l'hiver et au cours des migrations de nombreuses espèces européennes, parmi lesquelles figurent d'espèces rares et menacées, en regroupant ainsi jusqu'à 3.000.000 d'oiseaux: leur sauvegarde est le principal objectif du jumelage entre ces zones protégées de l'Afrique et de l'Europe, qui collaborent pour la protection du commun patrimoine naturel.

L'importance naturalistique du territoire de Djoudj, où vivent de nombreuses espèces animales extrêmement intéressantes, l'a poussé à devenir Parc national en 1971, site appartenant au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1981 et Zone Humide d'Importance Internationale, conformément à la Convention de Ramsar, à partir de 1984.

De cette façon, notamment avec le soutien apporté par un tourisme écho-compatible, qui valorise le territoire sans l'endommager, il sera possible de conserver pour les générations futures cette zone d'environ 16.000 hectares, située près de l'océan Atlantique et le delta du fleuve Sénégal, entourée d'autres vastes zones humides du territoire sénégalais et mauritanien, juste au sud des étendues désertiques du Sahara: un véritable paradis ornithologique

Le profit de la vente de ce texte contribuera à la gestion du Parc Djoudj et à l'amélioration des conditions des villages voisins.



PARCO  
ADDA SUD

